

Витапрост (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Витапрост (свечи)



Код АТХ:

- [G04BX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Простаты экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Витапрост®

Суппозитории ректальные, 50 (10) мг. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ или пленки ПВХ ламинированной ПЭ 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 (20) мг. В контурной ячейковой упаковке 10 шт. 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке.

Витапрост® форте

Суппозитории ректальные, 100 (20) мг. В контурной ячейковой упаковке 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке картонной.

Состав:

Витапрост®

Суппозитории ректальные	1 супп.
<i>активное вещество:</i>	
простаты экстракт («Сампрост» субстанция)	50 мг
(в пересчете на в пересчете на водорастворимые пептиды — 10 мг)	
<i>вспомогательное вещество:</i> жир твердый (Витепсол, марки Н 15, W35, Суппосир, марки NA 15, NAS 50) — достаточное количество для получения суппозитория массой 1,25 г	

Витапрост (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Витапрост®

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	1 табл.
<i>активное вещество:</i>	
простаты экстракт	100 мг
(в пересчете на водорастворимые пептиды — 20 мг)	
<i>вспомогательные вещества:</i> сахароза — 28,5 мг; лактозы моногидрат — 7,125 мг; кальция стеарата моногидрат — 2,5 мг; кросповидон — 9,275 мг; МКЦ — до 102,6 мг	
<i>оболочка:</i> акрил-из (метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер 1:1, титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат, индигокармин) — 25 мг	

Витапрост® форте

Суппозитории ректальные	1 супп.
<i>активное вещество:</i>	
простаты экстракт	100 мг
(в пересчете на водорастворимые пептиды — 20 мг)	
<i>вспомогательное вещество:</i> жир твердый (витепсол марки H15, W35; суппосир марки NA15, NAS50) — достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г	

Описание:

Витапрост®

Суппозитории: от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Таблетки: покрытые кишечнорастворимой оболочкой, от голубого до светло-синего цвета, круглые, двояковыпуклые, допускается наличие вкраплений.

Витапрост® форте

Суппозитории: белого с желтоватым, кремоватым или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, простатотропное.

Фармакодинамика

Витапрост®

Витапрост® форте

Обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Витапрост (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию. Витапрост® и Витапрост® форте нормализуют параметры предстательной железы и эякулята.

На основании данных клинических исследований доказано, что Витапрост® таблетки и Витапрост® форте умеренно уменьшают объем предстательной железы. Препараты уменьшают выраженность обструктивной и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении максимальной и средней объемных скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи.

Данные клинических исследований доказали, что применение препарата Витапрост® уменьшает вероятность развития обострений хронического абактериального простатита, не вызывает изменений показателей клинического и биохимического анализа крови, общего анализа мочи. Эффективность применения препарата Витапрост® для профилактики обострений хронического абактериального простатита по оценкам врачей-исследователей составляет 97,5%.

Витапрост® форте улучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого пузыря за счет расширения неповрежденных сосудов (эффект вазодилатации), этим способствует восстановлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, что стимулирует физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет улучшения процессов трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции регенераторных процессов. Активация органного кровотока способствует улучшению адаптационной и сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря.

Снижением ишемии детрузора можно объяснить выраженное снижение гиперактивности мочевого пузыря, которое продолжается и после окончания применения Витапрост® форте.

Показания к применению:

- хронический простатит;
- профилактика обострений хронического абактериального простатита (для таблеток);
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (для таблеток);
- состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки следует принимать внутрь по 1 таб. 2 раза/сут. Продолжительность курса лечения при *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* составляет не менее 30 дней; при *хроническом простатите* - не менее 10 дней.

Для *профилактики обострений хронического простатита* применяют по 1 таб. 2 раза/сут в течение не менее 30 дней - 1-2 раза/год.

Ректальные суппозитории применять следует после самопроизвольного опорожнения или очистительной клизмы кишечника по 1 суп. 1 раз/сут. После введения суппозитория пациенту следует находиться в постели в течение 30-40 мин.

Продолжительность курса лечения суппозиториями Витапрост составляет не менее 10 дней. .

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны - при применении суппозитория Витапрост; очень редко - при применении таблеток Витапрост.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат у женщин не применяется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Проведенные дополнительные клинические исследования, направленные на оценку степени уменьшения болевого синдрома в результате лечения хронического простатита препаратом Витапрост, позволили установить эффективность препарата при лечении хронического абактериального простатита, прежде всего для уменьшения болевого синдрома.

Препарат Витапрост суппозитории ректальные может быть рекомендован также в качестве одного из компонентов комплексной терапии хронического простатита у пациентов всех возрастных групп (в т.ч. при сочетании с доброкачественной гиперплазией предстательной железы), а также для реабилитации пациентов после перенесенного острого простатита.

Лечение хронического простатита, состояний до и после оперативных вмешательств на предстательной железе должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением таблеток Витапрост применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

Проведенные клинические исследования, направленные на оценку влияния препарата Витапрост на сперматогенез у пациентов с бесплодием, развившемся на фоне хронического простатита, позволили установить положительное влияние препарата на сперматогенез. Витапрост может быть рекомендован пациентам с секреторно-токсической формой бесплодия, развившейся на фоне хронического простатита.

Условия хранения:

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Суппозитории ректальные следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitaprost_svechi