

[Витрум Бьюти Элит](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Прочие препараты](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** от розовато-фиолетового до темно-фиолетового цвета с синеватым оттенком, овальные, двояковыпуклые, с легким специфическим запахом.

	1 таб.
бетакаротен	1700 МЕ (1.02 мг)
α-токоферола ацетат (вит. E)	13.6 МЕ (10 мг)
колекальциферол (вит. D ₃)	67.2 МЕ (1.68 мкг)
аскорбиновая кислота (вит. C)	40 мг
фолиевая кислота (вит. B ₉)	133 мкг
тиамина мононитрат (вит. B ₁)	2 мг
рибофлавин (вит. B ₂)	2 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. B ₅)	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B ₆)	5 мг
цианокобаламин (вит. B ₁₂)	4 мкг
никотинамид (вит. PP)	10 мг
рутозид (вит. P)	10 мг
биотин (вит. H)	133 мкг
пара-аминобензойная кислота	10 мг
папаин	3.3 мг
бетаина гидрохлорид	10 мг
инозитол	20 мг
холин	50 мг
цистеин	20 мг
аргинин	10 мг
лизин	20 мг

метионин	20 мг
кальций (в форме кальция гидрофосфата)	150 мг
магний (в форме магния оксида)	50 мг
фосфор (в форме кальция гидрофосфата)	155 мг
железо (в форме железа аминоката)	10 мг
цинк (в форме цинка оксида)	5 мг
марганец (в форме марганца глюконата)	3.33 мг
йод (в форме калия йодида)	75 мкг
селен (в форме селена аминоката)	8.3 мкг
бор (в форме бора цитрата)	500 мкг
листья алоэ барбадосского	25 мг
экстракт листьев чая	20 мг
экстракт виноградных косточек	20 мг
биофлавоноиды лимона	20 мг
экстракт листьев маслины европейской	20 мг
слоевища ламинарии	9 мг
экстракт листьев мяты перечной	5 мг
экстракт корневищ имбиря лекарственного	3 мг
экстракт листьев крапивы двудомной	3 мг
экстракт плодов аниса	3 мг
экстракт корневищ куркумы длинной	2 мг
экстракт травы хвоща полевого	2 мг
экстракт цветков лаванды	2 мг
экстракт коры коричника китайского	1 мг
экстракт листьев розмарина аптечного	1 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 69.47 мг, стеариновая кислота - 60.41 мг, кроскармеллоза натрия - 30.45 мг, магния стеарат - 13.5 мг, кремния диоксид коллоидный - 9 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 21.26 мг, титана диоксид (E171) - 7.2 мг, триацетин - 0.04 мг, краситель кармин красный (E120) - 1.2 мг, индигокармин (E132) - 0.3 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
90 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный поливитаминный препарат с микро- и макроэлементами, а также с растительными компонентами, действие которого обусловлено эффектами веществ, входящих в его состав.

Активные компоненты препарата являются важной составной частью ферментативных систем, участвующих в основных метаболических процессах; стимулируют защитные силы организма и процессы регенерации кожи; способствуют улучшению структуры волос и ногтей пластин; нормализуют работу пищеварительной системы, перистальтику кишечника; укрепляют стенки капилляров. Улучшают микроциркуляцию, уменьшают последствия стрессовых воздействий; обладают антиоксидантным действием, общеукрепляющим действием.

Показания к применению:

Профилактика гиповитаминозов, недостатка минеральных веществ в организме:

- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после заболеваний (в т.ч. инфекционных);
- при несбалансированном и неполноценном питании.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- артериальная гипотензия;

- тромбофлебит;
- беременность;
- период лактации;
- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется применять препарат при гипервитаминозе А и D.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 2 таб./сут после еды в течение 2 месяцев. Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, кожный зуд, крапивница.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные нарушения.

При случайной передозировке следует обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь; промывание желудка; проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания), в связи с недостатком данных о его применении в эти периоды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием других аналогичных поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять у пациентов с повышенным риском развития тромбозов: после операций на сердце, сосудах, аортокоронарного шунтирования.

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что не имеет клинического значения и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 10° до

30°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Byuti_Elit