# Витрум Центури




## Код АТХ:

- A11AA04

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** от светло-серого до темно-серого цвета, капсуловидные, с разделительной риской с одной стороны; на поперечном срезе - ядро от светло-серого до желтого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями; допускается наличие специфического запаха.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| ретинола ацетат (вит. А) и бетакаротен | 6000 МЕ, |
| что соответствует содержанию ретинола ацетата | 2 мг |
| что соответствует содержанию бетакаротена | 112 мкг |
| α-токоферола ацетат (вит. Е) | 45 МЕ (45 мг) |
| колекальциферол (вит. $D_3$) | 400 МЕ (10 мкг) |
| фитоменадион (вит. $K_1$) | 10 мкг |
| аскорбиновая кислота (вит. С) | 60 мг |
| тиамина гидрохлорид (вит. $B_1$) | 1.5 мг |
| рибофлавин (вит. $B_2$) | 1.7 мг |
| пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. $B_5$) | 10 мг |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. $B_6$) | 3 мг |
| никотинамид (вит. РР) | 20 мг |
| фолиевая кислота (вит. $B_c$) | 200 мкг |
| цианокобаламин (вит. $B_{12}$) | 25 мкг |
| биотин (вит. Н) | 30 мкг |

| | |
|---|---|
| калий (в форме калия хлорида) | 80 мг |
| кальций (в форме кальция гидрофосфата) | 200 мг |
| магний (в форме магния оксида) | 100 мг |
| фосфор (в форме кальция гидрофосфата) | 48 мг |
| железо (в форме железа фумарата) | 9 мг |
| медь (в форме меди оксида) | 2 мг |
| цинк (в форме цинка оксида) | 15 мг |
| марганец (в форме марганца сульфата) | 2.5 мг |
| йод (в форме калия йодида) | 150 мкг |
| молибден (в форме натрия молибдата) | 25 мкг |
| селен (в форме натрия селената) | 20 мкг |
| хром (в форме хрома хлорида) | 100 мкг |
| никель (в форме никеля сульфата) | 5 мкг |
| ванадий (в форме натрия метаванадата) | 10 мкг |
| бор (в форме натрия бората) | 150 мкг |
| хлорид (в форме калия хлорида) | 72 мг |
| кремний (в форме метасиликата натрия) | 10 мкг |

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая - 41.18 мг, стеариновая кислота - 36.29 мг, кремния диоксид коллоидный - 30 мг, кроскармеллоза натрия - 16.67 мг, магния стеарат - 12 мг.

*Состав оболочки:* гипромеллоза - 20.738 мг, триацетин - 0.003 мг, титана диоксид - 9.2 мг, краситель черный (индигокармин (E132), краситель солнечный закат желтый (E110), краситель красный очаровательный (E129)) - 0.04 мг, краситель солнечный закат желтый (E110) - 0.015 мг, краситель красный очаровательный (E129) - 0.001 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
120 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
130 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, содержащий витамины и минеральные вещества в специально подобранных дозах, соответствующих потребностям организма людей старше 50 лет.

## Показания к применению:

Профилактика гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ у людей старше 50 лет, в т.ч.:

— в период интенсивных умственных и физических нагрузок;

— в период выздоровления после перенесенных заболеваний;

— при недостаточном и несбалансированном питании.

## Противопоказания:

— возраст до 50 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Внутрь по 1 таб./сут после еды. Курс приема препарата - 3-4 месяца. Повторные курсы - по рекомендации врача.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции к компонентам препарата.

## Передозировка:

*Симптомы:* тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства.

*Лечение:* активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическая терапия.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Рекомендуется консультация врача.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат содержит железо и кальций и поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также противомикробных средств производных фторхинолона.

Витамин С усиливает действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов.

Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин, уменьшают всасывание железа.

При одновременном назначении тиазидных диуретиков увеличивается вероятность гиперкальциемии (повышенное содержание кальция в крови).

Не рекомендуется применять Витрум Центури совместно с препаратами, содержащими витамины A и D, из-за повышения риска передозировки этих витаминов.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендованную дозу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не оказывает влияния на способность к вождению транспортных средств и управление другими механизмами.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°C.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Vitrum_Centuri