

Витрум Кидс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Минералы](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Таблетки жевательные** в виде фигурок животных от светло-розового до темно-розового цвета, с небольшими вкраплениями светлого и темного цвета, с легким фруктовым вкусом и запахом.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. А)	2500 МЕ (860 мкг)
α-токоферола ацетат (вит. Е)	15 МЕ (15 мг)
колекальциферол (вит. D ₃)	400 МЕ (10 мкг)
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
тиамина мононитрат (вит. В ₁)	1.05 мг
рибофлавин (вит. В ₂)	1.2 мг
кальция пантотенат (вит. В ₅)	5 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆)	1.05 мг
фолиевая кислота (вит. В ₉)	300 мкг
цианокобаламин (вит. В ₁₂)	4.5 мкг
никотинамид (вит. РР)	13.5 мг
биотин (вит. Н)	20 мкг
кальций (в форме кальция карбоната)	100 мг
магний (в форме магния фосфата)	40 мг
фосфор (в форме магния фосфата)	50 мг
железо (в форме железа fumarата)	15 мг
медь (в форме меди оксида)	1 мг
цинк (в форме цинка оксида)	10 мг
марганец (в форме марганца цитрата)	1 мг
йод (в форме калия йодида)	150 мкг
селен (в форме натрия селената)	25 мкг
хром (в форме хрома аминокислоты)	20 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза - 488.53 мг, стеариновая кислота - 29.53 мг, кремния диоксид коллоидный - 12 мг, магния стеарат - 8 мг, ароматизатор клубничный - 10 мг, сукралоза - 1 мг, краситель красный очаровательный (E129) - 1.6 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сбалансированный комплекс витаминов и минералов способствует здоровому росту и умственному развитию детей. Специально подобранные дозы соответствуют ежедневной потребности ребенка с 4 до 7 лет в витаминах, макро- и микроэлементах. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав ингредиентов.

Показания к применению:

- профилактика и лечение гиповитаминоза и недостатка минеральных веществ у детей в период интенсивного роста;
- период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- несбалансированное или неполноценное питание, пониженный аппетит.

Противопоказания:

- гипервитаминоз А и D;
- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки следует принимать внутрь после еды, тщательно разжевывая.

Назначают **детям в возрасте от 4 до 7 лет** - по 1 таб./сут.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

Передозировка:

При случайной передозировке следует обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины А, Е, D и железо, во избежание передозировки.

Фосфаты и соли кальция снижают абсорбцию магния в ЖКТ; магний снижает всасывание тетрациклина.

Пиридоксин угнетает активность леводопы.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных.

Применение в пожилом возрасте

Назначают детям от 4 до 7 лет

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 4-х лет. Назначают детям от 4 до 7 лет

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре 10-30°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Kids