
Витрум Мемори



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гинкго двулопастного листьев экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** (прозрачной) от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с вкраплениями, круглые, двояковыпуклые, с разделительной риской с одной стороны; допускается наличие специфического запаха.

	1 таб.
экстракт листьев гинкго двулопастного	60 мг,
в т.ч. флавоновых гликозидов 24% (стандартизирован по содержанию флавоновых гликозидов 14.4 мг)	

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат - 313 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 50 мг, стеариновая кислота - 9 мг, кроскармеллоза натрия - 11 мг, магния стеарат - 5 мг, кремния диоксид коллоидный - 2 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 9.7 мг, триацетин - 2.8 мг.

30 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
30 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
30 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом и глюкозой, нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и микроциркуляцию. Оказывает регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулируя кровенаполнение сосудов. Препятствует тромбообразованию. Оказывает противоотечный эффект (головной мозг, периферические ткани), нормализует нейромедиаторные процессы в ЦНС.

Оказывает антигипоксическое действие, улучшает память и способность к обучению, стимулирует мозговую деятельность.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Витрум Мемори не предоставлены.

Показания к применению:

— снижение внимания, памяти, быстроты мышления, ухудшение интеллектуальных способностей, слуха, зрения, речевых функций (в т.ч. в результате возрастных изменений);

— в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения и микроциркуляции нижних конечностей.

Противопоказания:

— гипокоагуляция;

— острые нарушения мозгового кровообращения;

— острый инфаркт миокарда;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— эрозивный гастрит;

— артериальная гипотензия;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— детский возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь, во время приема пищи, по 1 таб. 2 раза/сут. Средняя продолжительность лечения - 3 мес. Повторные курсы возможны после консультации с врачом.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головная боль, бессонница, головокружение.

Прочие: диспепсия, кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическая терапия. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать комбинации с ацетилсалициловой кислотой, варфарином, тиазидными диуретиками, трициклическими антидепрессантами, противосудорожными препаратами, гентамицином.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата.

Улучшение состояния проявляется, как правило, через 1 месяц после начала лечения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период приема препарата не рекомендуется выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Memori