

Витрум Перфоменс



Код АТХ:

- [A11BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** от светло-оранжевого до темно-оранжевого цвета, капсуловидной формы, с разделительной риской с одной стороны; допускается наличие специфического запаха.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. А)	1.55 мг (4500 ME)
бетакаротен	300 мкг (500 ME)
колекальциферол (вит. D ₃)	10 мкг (400 ME)
α-токоферола ацетат (вит. Е)	60 мг (60 ME)
фитоменадион (вит. К ₁)	25 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	120 мг
тиамина мононитрат (вит. В ₁)	4.5 мг
рибофлавин (вит. В ₂)	5.1 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. В ₅)	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆)	6 мг
цианокобаламин (вит. В ₁₂)	18 мкг
никотинамид (вит. РР)	40 мг
фолиевая кислота (вит. В ₉)	400 мкг
биотин (вит. Н)	40 мкг
калий (в форме хлорида)	80 мг
кальций (в форме гидрофосфата и карбоната)	100 мг
магний (в форме оксида)	40 мг
фосфор (в форме кальция гидрофосфата)	48 мг
железо (в форме фумарата)	18 мг
медь (в форме оксида)	2 мг
цинк (в форме оксида)	15 мг
марганец (в форме сульфата)	4 мг
йод (в форме калия йодида)	150 мкг
молибден (в форме натрия молибдата)	75 мкг
селен (в форме натрия селената)	70 мкг
хром (в форме хлорида)	120 мкг
никель (в форме сульфата)	5 мкг
ванадий (в форме натрия метаванадата)	10 мкг

олово (в форме хлорида)	10 мкг
бор (в форме натрия бората)	60 мкг
кремний (в форме диоксида)	4 мг
хлорид (в форме калия хлорида)	72 мг
экстракт корня женьшеня настоящего	50 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 151.87 мг, стеариновая кислота - 42 мг, кроскармеллоза натрия - 30 мг, магния стеарат - 14 мг.

Состав пленочной оболочки: гипромеллоза - 16.5 мг, титана диоксид - 13 мг, триацетин - 0.3 мг, краситель солнечный закат желтый (E110) - 0.1 мг, краситель красный очаровательный (E129) - 0.1 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
90 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
120 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологические свойства определяются комплексом витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и растительных компонентов, входящих в состав препарата.

Витамины, минеральные вещества и микроэлементы снижают последствия некачественного питания, вредных экологических факторов, стрессовых воздействий, активизируют защитные силы организма при длительных и тяжелых болезнях.

Комплекс биологически активных веществ женьшеня (сапониновые гликозиды - гинсенозиды, элеутерозиды, пептиды, эфирные масла, стирол, витамины и минералы) обладает адаптогенным, стимулирующим и дезинтоксикационным действием. Ослабляет негативные биохимические и функциональные сдвиги в организме при стрессовых реакциях. Регулирует работу желез внутренней секреции, незначительно снижает АД, уровень холестерина и глюкозы в крови.

Препарат обладает антиоксидантными и общетонизирующими свойствами, оказывает воздействие при поддерживающей терапии на фоне общего ослабления функций организма, перенапряжении и ощущении усталости, в период реконвалесценции.

Показания к применению:

- астенические состояния различного происхождения, общая слабость и переутомление, пониженный иммунитет, хроническая усталость;
- длительные физические и психические нагрузки;
- неврозы и раздражительность;
- период восстановления после тяжелых заболеваний;
- во время и после лечения антибиотиками и химиотерапевтическими средствами;
- простудные заболевания.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— повышенная возбудимость;

— расстройства сна.

Способ применения и дозы:

Взрослым по 1 таб./сут во время еды. Перед применением препарата проконсультироваться с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендованную дозировку.

Не рекомендуется применять совместно с другими витаминными препаратами, а также с препаратами с выраженным тонизирующим действием.

Условия хранения:

При температуре 10-30°C, в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Perfomens?page=2