


## [Витрум Пренатал форте](#)



### Код АТХ:

- [A11AA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки покрытые пленочной оболочкой** от светло-серого до темно-серого цвета, капсуловидной формы, с гравировкой "PRENATAL" с одной стороны и "FORTE" - с другой, со специфическим запахом.

	<b>1 таб.</b>
ретинола ацетат (вит. А)	2500 МЕ (860 мкг)
бетакаротен	2500 МЕ (1500 мкг)
альфа-токоферола ацетата (вит. Е)	30 МЕ (30 мг)
колекальциферол (вит. D <sub>3</sub> )	400 МЕ (10 мкг)
аскорбиновая кислота (вит. С)	120 мг
тиамина мононитрат (вит. В <sub>1</sub> )	3 мг
рибофлавин (вит. В <sub>2</sub> )	3.4 мг
кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту (вит. В <sub>5</sub> )	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В <sub>6</sub> )	10 мг
фолиевая кислота (вит. В <sub>9</sub> )	800 мкг
цианокобаламин (вит. В <sub>12</sub> )	12 мкг
никотинамид (вит. РР)	20 мг
биотин (вит. Н)	30 мкг
кальция карбонат в пересчете на кальций	200 мг
магния оксид в пересчете на магний	25 мг
железа фумарат в пересчете на железо	60 мг

## Витрум Пренатал форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

меди оксид в пересчете на медь	2 мг
цинка оксид в пересчете на цинк	25 мг
марганца сульфат в пересчете на марганец	5 мг
калия йодид в пересчете на йод	150 мкг
натрия молибдат в пересчете на молибден	25 мкг
натрия селенат в пересчете на селен	20 мкг
хрома хлорид в пересчете на хром	25 мкг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая - 195.66 мг, стеариновая кислота - 45 мг, кроскармеллоза натрия - 28 мг, магния стеарат - 15 мг, кремния диоксид коллоидный - 7 мг.

*Состав оболочки:* гипромеллоза - 19.5 мг, титана диоксид - 9.86 мг, триацетин - 0.6 мг, краситель бриллиантовый черный (E151) - 0.036 мг, краситель красный очаровательный (E129) - 0.004 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
120 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Поливитаминовый препарат с минералами. Действие препарата определяется свойствами витаминов и минералов, входящих в состав препарата. Обеспечивает восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ в организме женщины в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания.

## Показания к применению:

- профилактика гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания;
- профилактика железодефицитной анемии у беременных, дефицита кальция в организме матери.

## Относится к болезням:

- [Железодефицитная анемия](#)

## Противопоказания:

- гипервитаминоз А и D;
- избыточное накопление железа в организме;
- гиперкальциемия;
- гиперкальциурия;
- мочекаменная болезнь;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Рекомендуется женщинам на этапе планирования беременности, при беременности и после родов принимать внутрь по 1 таб./сут после завтрака, запивая водой. Курс приема препарата по рекомендации врача.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции на компоненты препарата.

*Прочие:* возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные расстройства.

*Лечение:* прием активированного угля внутрь, промывание желудка, проведение симптоматической терапии. В случае передозировки пациент должен обратиться к врачу.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Витрум Пренатал Форте содержит железо и кальций, поэтому при совместном применении антибиотиков группы тетрациклина и противомикробных средств - производных фторхинолона происходит замедление абсорбции последних из ЖКТ.

Витамин С усиливает фармакологическое действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов (в т.ч. возрастает риск развития кристаллурии).

При одновременном применении антацидных препаратов, в состав которых входят алюминий, кальций, магний, а также колестирамин происходит уменьшение абсорбции железа.

При совместном применении препарата Витрум Пренатал Форте с тиазидными диуретиками увеличивается риск развития гиперкальциемии.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

Не рекомендуют принимать Витрум Пренатал Форте одновременно с препаратами, в состав которых входят витамины А и D, поскольку при этом повышается риск развития передозировки указанных витаминов.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Нет данных.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказано применение препарата при гиперкальциурии, мочекаменной болезни.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°С.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vitrum\\_Prenatal\\_forte](http://drugs.thead.ru/Vitrum_Prenatal_forte)