Витрум Пренатал форте



Код АТХ:

- A11AA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки покрытые пленочной оболочкой*** от светло-серого до темно-серого цвета, капсуловидной формы, с гравировкой "PRENATAL" с одной стороны и "FORTE" - с другой, со специфическим запахом.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. A)	2500 МЕ (860 мкг)
бетакаротен	2500 МЕ (1500 мкг)
альфа-токоферола ацетата (вит. E)	30 МЕ (30 мг)
колекальциферол (вит. D_3)	400 МЕ (10 мкг)
аскорбиновая кислота (вит. C)	120 мг
тиамина мононитрат (вит. B_1)	3 мг
рибофлавин (вит. B_2)	3.4 мг
кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту (вит. B_5)	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	10 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	800 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	12 мкг
никотинамид (вит. PP)	20 мг
биотин (вит. H)	30 мкг
кальция карбонат в пересчете на кальций	200 мг
магния оксид в пересчете на магний	25 мг
железа фумарат в пересчете на железо	60 мг

меди оксид в пересчете на медь	2 мг
цинка оксид в пересчете на цинк	25 мг
марганца сульфат в пересчете на марганец	5 мг
калия йодид в пересчете на йод	150 мкг
натрия молибдат в пересчете на молибден	25 мкг
натрия селенат в пересчете на селен	20 мкг
хрома хлорид в пересчете на хром	25 мкг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 195.66 мг, стеариновая кислота - 45 мг, кроскармеллоза натрия - 28 мг, магния стеарат - 15 мг, кремния диоксид коллоидный - 7 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 19.5 мг, титана диоксид - 9.86 мг, триацетин - 0.6 мг, краситель бриллиантовый черный (E151) - 0.036 мг, краситель красный очаровательный (E129) - 0.004 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
120 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитаминный препарат с минералами. Действие препарата определяется свойствами витаминов и минералов, входящих в состав препарата. Обеспечивает восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ в организме женщины в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания.

Показания к применению:

— профилактика гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания;

— профилактика железодефицитной анемии у беременных, дефицита кальция в организме матери.

Относится к болезням:

- Железодефицитная анемия

Противопоказания:

— гипервитаминоз A и D;

— избыточное накопление железа в организме;

— гиперкальциемия;

— гиперкальциурия;

— мочекаменная болезнь;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Рекомендуется женщинам на этапе планирования беременности, при беременности и после родов принимать внутрь по 1 таб./сут после завтрака, запивая водой. Курс приема препарата по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции на компоненты препарата.

Прочие: возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные расстройства.

Лечение: прием активированного угля внутрь, промывание желудка, проведение симптоматической терапии. В случае передозировки пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Витрум Пренатал Форте содержит железо и кальций, поэтому при совместном применении антибиотиков группы тетрациклина и противомикробных средств - производных фторхинолона происходит замедление абсорбции последних из ЖКТ.

Витамин С усиливает фармакологическое действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов (в т.ч. возрастает риск развития кристаллурии).

При одновременном применении антацидных препаратов, в состав которых входят алюминий, кальций, магний, а также колестирамин происходит уменьшение абсорбции железа.

При совместном применении препарата Витрум Пренатал Форте с тиазидными диуретиками увеличивается риск развития гиперкальциемии.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

Не рекомендуют принимать Витрум Пренатал Форте одновременно с препаратами, в состав которых входят витамины A и D, поскольку при этом повышается риск развития передозировки указанных витаминов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при гиперкальциурии, мочекаменной болезни.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Prenatal_forte