Витрум Суперстресс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины
- Минералы

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** темно-красного цвета, капсуловидные; допускается наличие специфического запаха.

	1 таб.
dL-альфа-токоферола ацетат (вит. E)	30 мг (30 МЕ)
аскорбиновая кислота (вит. C)	500 мг
тиамина гидрохлорид (вит. B_1)	15 мг
рибофлавин (вит. B_2)	10 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. B_5)	20 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	5 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	400 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	12 мкг
никотинамид (вит. PP)	100 мг
биотин (вит. H)	45 мкг
железо (в форме железа фумарата)	27 мг

Вспомогательные вещества: кальция сульфат, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, кроскармеллоза натрия, стеариновая кислота, магния стеарат.

Состав оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, краситель красный очаровательный (E129), краситель солнечный закат желтый (E110).

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитамины с микроэлементами.

Фармакологические свойства определяются комплексом витаминов, входящих в состав препарата.

Показания к применению:

Рекомендуется в качестве лечебно-профилактического средства:

— предупреждение и лечение гиповитаминозов и дефицита железа в период выздоровления после различных заболеваний, травм, операций;

— период повышенных психических и физических нагрузок.

Относится к болезням:

- Травмы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым по 1 таб./сут после еды в течение 1 месяца. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Возможно окрашивание стула в темный цвет.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендованную дозу.

Не рекомендуется использовать совместно с препаратами, содержащими вышеуказанные вещества.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 10° до 30°С, в сухом и недоступном для детей месте. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Superstress