

## [Витрум Витамин Е](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Капсулы</b>	<b>1 капс.</b>
D,L- $\alpha$ -токоферола ацетат	400 МЕ

12 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

12 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Обладает антиоксидантной активностью, участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании, других важнейших процессах тканевого метаболизма; препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров, развитию атеросклероза, дегенеративно-дистрофических изменений в сердечной мышце и скелетной мускулатуре; нормализует репродуктивную функцию.

#### Фармакокинетика

Из ЖКТ медленно всасывается примерно 50%, максимальный уровень в крови создается примерно через 4 ч. Для абсорбции необходимо наличие желчных кислот. В процессе всасывания образует комплекс с липопротеидами, являющимися переносчиками витамина Е. Депонируется в надпочечниках, жировой и мышечной ткани, печени. Подвергается метаболизму и выделяется из организма в неизменном виде и в виде метаболитов с желчью (90%) и мочой (6%).

### Показания к применению:

- лечение гиповитаминоза, состояний реконвалесценции после заболеваний, протекавших с лихорадочным синдромом, физические нагрузки;
- в составе комплексной терапии для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, глазных болезней;
- в комплексе мероприятий по предупреждению атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы у пациентов пожилого возраста;
- мышечные дистрофии, дерматомиозит, амиотрофический боковой склероз,
- дегенеративные и пролиферативные изменения суставов и связочного аппарата позвоночника и крупных суставов;

- неврастения при переутомлении, астенический синдром;
- нарушения менструального цикла, климактерические вегетативные нарушения;
- нарушения функции половых желез у мужчин;
- лечение кожных заболеваний, ожогов.

**Относится к болезням:**

- [Астения](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Дерматит](#)
- [Дерматомиозит](#)
- [Лихорадка](#)
- [Нарушения менструального цикла](#)
- [Неврит](#)
- [Реконвалесценция](#)
- [Склерит](#)

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к препарату.

**Способ применения и дозы:**

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Внутри по 1 капсуле в сутки (400 МЕ/400 мг) с небольшим количеством воды во время или после еды. Курс приема препарата по рекомендации врача.

**Побочное действие:**

При приеме в высоких дозах (более 1 г/сут) возможны боли в верхней части живота, диарея, аллергические реакции.

**Передозировка:**

*Симптомы:* креатинурия, диарея, боли в эпигастрии.

В случае возникновения аллергической реакции при повышенной чувствительности к препарату следует уменьшить дозу или обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Усиливает эффект ГКС и НПВС, сердечных гликозидов.

Препараты, содержащие железо, рекомендуется принимать внутрь не ранее 8 ч после приема витамина Е.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Соблюдать осторожность при применении витамина Е в высоких дозах при тяжелом кардиосклерозе, повышенном риске эмболии и при инфаркте миокарда в остром периоде.

**Условия хранения:**

Хранить при комнатной температуре в сухом, защищенном от света (ультрафиолетовые лучи разрушают витамин Е),

## **Витрум Витамин Е**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

недоступном для детей месте при температуре ниже 30°C. Срок годности - 3 года. Препарат не следует применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vitrum\\_Vitamin\\_E](http://drugs.thead.ru/Vitrum_Vitamin_E)