Витрум Витамин Е



Код АТХ:

- A11HA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Витамин е

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капсулы***	**1 капс.**
D,L-α-токоферола ацетат	400 МЕ

12 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
12 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антиоксидантное, восполняющее дефицит витамина Е.

Фармакодинамика

Участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, в тканевом дыхании и других важнейших процессах клеточного метаболизма.

Фармакокинетика

Из ЖКТ медленно всасывается примерно 50%, максимальный уровень в крови создается примерно через 4 ч. Для абсорбции необходимо наличие желчных кислот. В процессе всасывания образует комплекс с липопротеидами, являющимися переносчиками витамина Е. Депонируется в надпочечниках, жировой и мышечной ткани, печени. Подвергается метаболизму и выделяется из организма в неизмененном виде и в виде метаболитов с желчью (90%) и мочой (6%).

Показания к применению:

— лечение гиповитаминоза, состояний реконвалесценции после заболеваний, протекавших с лихорадочным синдромом, физические нагрузки;

— в составе комплексной терапии для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, глазных болезней;

— в комплексе мероприятий по предупреждению атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы у пациентов пожилого возраста;

— мышечные дистрофии, дерматомиозит, амиотрофический боковой склероз,

— дегенеративные и пролиферативные изменения суставов и связочного аппарата позвоночника и крупных суставов;

— неврастения при переутомлении, астенический синдром;

— нарушения менструального цикла, климактерические вегетативные нарушения;

— нарушения функции половых желез у мужчин;

— лечение кожных заболеваний, ожогов.

Относится к болезням:

- Астения
- Атеросклероз
- Дерматит
- Дерматомиозит
- Лихорадка
- Нарушения менструального цикла
- Неврит
- Реконвалесценция
- Склерит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Внутрь по 1 капсуле в сутки (400 МЕ/400 мг) с небольшим количеством воды во время или после еды. Курс приема препарата по рекомендации врача.

Побочное действие:

При приеме в высоких дозах (более 1 г/сут) возможны боли в верхней части живота, диарея, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: креатинурия, диарея, боли в эпигастрии.

В случае возникновения аллергической реакции при повышенной чувствительности к препарату следует уменьшить дозу или обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффект ГКС и НПВС, сердечных гликозидов.

Препараты, содержащие железо, рекомендуется принимать внутрь не ранее 8 ч после приема витамина Е.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Аневризма аорты
- Аритмии
- Артериальная гипертензия
- Атриовентрикулярная блокада

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре в сухом, защищенном от света (ультрафиолетовые лучи разрушают витамин Е), недоступном для детей месте при температуре ниже 30°С. Срок годности - 3 года Препарат не следует применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Vitamin_E_0