

Витрум Вижн форте



Код АТХ:

- [A11AB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр^{МНН}](#) [Википедия^{МНН}](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com^{англ}](#)

Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** от желтовато-белого с коричневатым оттенком до светло-желтого цвета, овальные, двояковыпуклые; допускается наличие специфического запаха.

	1 таб.
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
α-токоферола ацетат (вит. Е)	10 мг ¹
рибофлавин (вит. В ₂)	1.2 мг
бетакаротен	1.5 мг
лютеин	6 мг
зеаксантин	0.5 мг
рутозид ²	25 мг
селена аминокват в пересчете на селен	25 мкг
цинка оксид в пересчете на цинк	5 мг
черники обыкновенной плодов экстракт сухой	60 мг
с содержанием суммы антоцианов 25% ³	

¹ - Эквивалентно 10 МЕ витамина Е.

² - Синоним рутина.

³ - Черники обыкновенной плодов экстракт сухой с содержанием суммы антоцианов 25%. Производящее растение: Черника обыкновенная - *Vaccinium myrtillus* L, семейство: Вересковые - Ericaceae.

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат - 350.07 мг, стеариновая кислота - 39.25 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 31.75 мг, кремния диоксид коллоидный - 15.5 мг, кроскармеллоза натрия - 14.5 мг, магния

стеарат - 8 мг.

Состав пленочной оболочки: гипромеллоза - 7.85 мг, титана диоксид - 3.85 мг, пропиленгликоль - 0.001 мг, макрогол-400 - 0.0001 мг, опадрай II желтый (поливиниловый спирт, тальк, титана диоксид, макрогол-3350, лецитин соевый, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный) - 42.3 мг.

15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (8) - пачки картонные.
30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитамино-минеральный комплекс с растительными компонентами. Содержит лютеин, зеаксантин и черники обыкновенной плодов экстракт. Оказывает антиоксидантное действие (защищает глазную ткань от воздействия свободных радикалов). Оказывает метаболическое действие, укрепляет капилляры глаза, усиливает остроту зрения (в т.ч. у больных с осложненной миопией), улучшает сумеречное зрение, улучшает зрение при повышенных нагрузках на глаза.

Показания к применению:

- зрительное утомление (усталость и боль в глазах) при чтении, ношении контактных линз, работе с компьютером;
- комплексная терапия близорукости различной степени;
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дистрофия сетчатки;
- в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах;
- нарушение механизмов адаптации зрения к темноте.

Относится к болезням:

- [Ретинопатия](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают по 1 таб. 2 раза/сут после еды. Курс лечения составляет 3 мес. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства. В случае передозировки пациент должен обратиться к врачу.

Лечение: прием активированного угля внутрь, промывание желудка, проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможность применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) врач определяет индивидуально.

Данные об особенностях медицинского применения препарата Витрум Вижн Форте при беременности и в период грудного вскармливания отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автомобиля и управлению другими механизмами.

Применение в детском возрасте

Препарат назначают взрослым и детям старше 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°C. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Vizhn_forte?page=2