Витрум Юниор



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины
- Минералы

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки жевательные*** от светло-коричневого до оранжевато-светло-коричневого цвета, со светлыми и темными вкраплениями, круглые, плоские, со скошенным краем, с разделительной риской с одной стороны, с легким фруктовым запахом.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. А)	5000 МЕ,
что соответствует содержанию ретинола	1.72 мг
α-токоферола ацетат (вит. Е)	30 МЕ (30 мг)
колекальциферол (вит. D_3)	400 МЕ (10 мкг)
фитоменадион (вит. K_1)	10 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	300 мг
тиамина мононитрат (вит. B_1)	1.5 мг
рибофлавин (вит. B_2)	1.7 мг
кальция пантотенат (вит. B_5)	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	2 мг
фолиевая кислота (вит. B_9)	400 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	6 мкг
никотинамид (вит. РР)	20 мг
биотин (вит. Н)	45 мкг
кальций (в форме кальция гидрофосфата)	160 мг
магний (в форме магния оксида)	40 мг
фосфор (в форме кальция гидрофосфата)	50 мг
железо (в форме железа фумарата)	18 мг
медь (в форме меди оксида)	2 мг
цинк (в форме цинка оксида)	15 мг
марганец (в форме марганца сульфата)	1 мг

йод (в форме калия йодида)	150 мкг
молибден (в форме натрия молибдата)	20 мкг
хром (в форме хрома хлорида)	20 мкг

Вспомогательные вещества: сорбитол - 100 мг, сахароза - 250 мг, стеариновая кислота - 100 мг, кремния диоксид коллоидный - 7 мг, магния стеарат - 18 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 118.8 мг, лимонная кислота - 13 мг, ароматизатор апельсиновый - 15 мг, ароматизатор ананасовый - 3 мг, аспартам - 10 мг, краситель солнечный закат желтый (Е110) - 2 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
90 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого определяется эффектами входящих в его состав витаминов и минеральных веществ.

Специально подобранные дозы соответствуют ежедневной потребности ребенка в витаминах, макро- и микроэлементах. Способствует повышению неспецифических защитных сил организма.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гиповитаминозов и недостатка макро- и микроэлементов у детей и подростков, в т.ч.:

— в период интенсивного роста;

— при повышенных физических и умственных нагрузках;

— в период выздоровления после перенесенных заболеваний;

— при несбалансированном или неполноценном питании.

Противопоказания:

— гипервитаминоз A и D;

— детский возраст до 4 лет;

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать внутрь после еды, разжевав таблетку.

Детям старше 7 лет назначают по 1 таб./сут, **детям от 4 до 7 лет** - по 1/2 таб./сут.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, возможно окрашивание стула в темный цвет, что не представляет опасности.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные нарушения.

При случайной передозировке обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины и железо, во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Применение в пожилом возрасте

Назначают детям и подросткам

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 4 лет

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 10 до 30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Yunior