

## Визин Классический



### Код АТХ:

- [S01GA02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тетризолин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли глазные 0.05%** прозрачные, бесцветные.

	<b>1 мл</b>
тетризолина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* борная кислота, натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорида раствор 17%, натрия борат, вода очищенная.

15 мл - флаконы пластиковые с капельницей (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Альфа-адреномиметик. Тетризолин стимулирует  $\alpha$ -адренорецепторы симпатической нервной системы, не оказывает или оказывает слабое действие на  $\beta$ -адренорецепторы. Обладает сосудосуживающим действием и уменьшает отек

тканей.

Действие препарата начинается через 60 сек после закапывания и продолжается 4-8 ч.

### **Фармакокинетика**

Тетризолин практически не всасывается при местном применении.

Подробные фармакокинетические исследования при применении глазных капель не проводились.

## **Показания к применению:**

— отек и гиперемия конъюнктивы, возникающие при аллергии или обусловленные воздействием химических и физических факторов (дым, пыль, хлорированная вода, свет, косметические средства, контактные линзы).

Препарат назначают взрослым и детям старше 2 лет.

Детям младше 6 лет препарат назначают под контролем врача.

## **Относится к болезням:**

- [Конъюнктивит](#)

## **Противопоказания:**

- эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы;
- закрытоугольная глаукома;
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях (например, ИБС, артериальная гипертензия, аритмии, аневризма), гипертиреозе, сахарном диабете, феохромоцитоме и у больных, получающих ингибиторы MAO или другие средства, способные повышать АД.

## **Способ применения и дозы:**

Закапывают по 1-2 капли в пораженный глаз 2-3 раза/сут.

Не рекомендуется непрерывное применение препарата более 4 дней.

При закапывании необходимо снять крышку с флакона-капельницы и перевернуть флакон.

Необходимо избегать прикосновения кончика капельницы к каким-либо поверхностям.

После применения следует завинтить крышку флакона-капельницы.

## **Побочное действие:**

*Со стороны органа зрения:* в редких случаях - чувство жжения, покраснение глаза, боль и покалывание в глазу, затуманенность зрения, раздражение конъюнктивы, расширение зрачка.

Пациента следует предупредить о том, что при развитии любых побочных реакций следует немедленно обратиться к врачу.

## **Передозировка:**

При применении препарата в соответствии с инструкцией риск развития передозировки минимален. Однако при попадании препарата в ЖКТ возможны следующие *симптомы*: расширение зрачка, тошнота, цианоз, лихорадка, судороги, тахикардия, аритмия, остановка сердца, артериальная гипертензия, отек легких, нарушения дыхательной

функции, функции ЦНС, кома.

Риск появления симптомов передозировки, связанных с всасыванием препарата, высок у новорожденных и детей младшего возраста, особенно при проглатывании капель.

*Лечение:* при необходимости назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислорода, жаропонижающие и противосудорожные средства. Для снижения АД возможно в/в медленное введение 5 мг фентоламина в физиологическом растворе или прием внутрь фентоламина в дозе 100 мг. Больным с низким АД вазопрессорные средства противопоказаны. Специфический антидот неизвестен.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С учетом риска развития системных побочных реакций применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в случаях, когда предполагаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата не изучено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед закапыванием препарата необходимо снять контактные линзы и установить их примерно через 15 мин после инстилляций.

Препарат целесообразно применять только при легком раздражении глаз. Пациент должен быть предупрежден, что если в течение 48 ч состояние не улучшается или раздражение и гиперемия сохраняются или нарастают, следует отменить препарат и обратиться к врачу.

Пациент должен быть информирован о том, что при появлении интенсивных болей в глазах, головной боли, потери зрения, внезапном появлении "плавающих" пятен перед глазами, при покраснении глаз, боли при воздействии света или при появлении двоения в глазах необходимо немедленно обратиться к врачу.

Не следует применять препарат, если раздражение или гиперемия связаны с серьезными заболеваниями органа зрения, такими как инфекция, инородное тело или химическая травма роговицы.

Пациент должен быть информирован о том, что если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности, то не следует выбрасывать его в сточные воды или на улицу. Необходимо поместить лекарственное средство в пакет и положить в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В редких случаях после применения глазных капель наблюдается расширение зрачка и возникает затуманенность зрения, которая может повлиять на способность управлять автомобилем или механизмами.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте до 2 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Содержимое открытого флакона следует использовать в течение 4 недель.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

## **Визин Классический**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vizin\\_Klassicheskiy](http://drugs.thead.ru/Vizin_Klassicheskiy)