Визомитин

Код АТХ:

- S01XA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные прозрачные или слегка опалесцирующие, бесцветные или слегка окрашенные.

	1 мл
пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид	0.155 мкг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0.1 мг, гипромеллоза 2 мг, натрия хлорид 9 мг, натрия дигидрофосфат 0.81 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат 116.35 мг, натрия гидроксида раствор 1 М до pH 6.3-7.3, вода д/и до 1 мл.

5 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Пластохинонилдецилтрифенилфосфомия бромид (ПДТФ) является производным пластохинона, который через

линкерную цепь (СЮ) связан с остатком трифенилфосфина. ПДТФ в низких (наномолярных) концентрациях проявляет высокую антиоксидантную активность. Также оказывает стимулирующее действие на процесс слезопродукции, эпителизации, способствует повышению стабильности слезной пленки.

Фармакокинетика

Исследований фармакокинетики у человека не проводилось. В доклинических исследованиях на животных распределение ПДТФ в органах и тканях происходило в течение 48 ч после в/в и внутрижелудочного введения. Было обнаружено, что ПДТФ присутствует в наибольших концентрациях в тканях почки, печени и сердце в течение 1 ч после введения. ПДТФ относительно быстро подвергается ферментативному расщеплению и ковалентному связыванию с белками.

Показания к применению:

— синдром "сухого глаза".

Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза/сут. Длительность курса лечения устанавливается врачом в зависимости от выраженности симптомов.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке при местном применении отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных контролируемых исследований у беременных и кормящих грудью женщин не проводилось. Не рекомендуется назначать препарат во время беременности. При необходимости назначения в период лактации на период лечения грудное вскармливание следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При необходимости можно применять одновременно с другими глазными каплями. При этом перерыв между инстилляциями должен быть не менее 5 минут.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Если после применения препарата возникает кратковременная нечеткость зрения, до его восстановления не рекомендуется управлять транспортными средствами и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 2-8°C.

Вкрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре 2-8°C; использовать в течение 1 месяца.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Вскрытый флакон использовать в течение 1 месяца.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vizomitin