

## Вобэнзим



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** красно-оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гладкой поверхностью, с характерным запахом; допускаются колебания в интенсивности окраски внешней оболочки от красно-оранжевого до красного цвета.

	<b>1 таб.</b>
панкреатин	345 прот.ЕД.Ph.Eur.
папаин	90 ЕД.FIP
рутозид	50 мг
бромелаин	225 ЕД.FIP
трипсин	360 ЕД.FIP
липаза	34 ЕД.FIP
амилаза	50 ЕД.FIP
химотрипсин	300 ЕД.FIP

**Вспомогательные вещества:** лактоза, крахмал кукурузный, магния стеарат, стеариновая кислота, вода очищенная, кремния диоксид коллоидный, тальк, сахароза.

**Состав оболочки таблеток:** сахароза, тальк, сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата, шеллак, титана диоксид, глина белая, краситель желто-оранжевый (E110), краситель пунцовый 4R (E124), повидон, макрогол 6000, триэтилцитрат, ванилин, воск отбеленный, воск карнаубский.

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.

800 шт. - флаконы из полиэтилена высокой плотности.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Представляет собой комбинацию высокоактивных ферментов растительного и

животного происхождения. Оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, фибринолитическое, противоотечное, антиагрегантное и вторичное анальгезирующее действие.

Вобэнзим оказывает положительное воздействие на ход воспалительного процесса, ограничивает патологические проявления аутоиммунных и иммунокомплексных процессов, положительно влияет на показатели иммунологической реактивности организма. Стимулирует и регулирует функциональную активность моноцитов-макрофагов, естественных киллеров, стимулирует противоопухолевый иммунитет, цитотоксические Т-лимфоциты, фагоцитарную активность клеток.

Под воздействием Вобэнзима снижается количество циркулирующих иммунных комплексов и происходит выведение мембранных депозитов иммунных комплексов из тканей.

Вобэнзим уменьшает инфильтрацию интерстиция плазматическими клетками. Повышает элиминацию белкового детрита и депозитов фибрина в зоне воспаления, ускоряет лизис токсических продуктов обмена веществ и отмирающих тканей, улучшает рассасывание гематом и отеков, нормализует проницаемость стенок сосудов.

Вобэнзим снижает концентрацию тромбосана и агрегацию тромбоцитов. Регулирует адгезию клеток крови, повышает способность эритроцитов изменять свою форму, регулируя их пластичность, нормализует число нормальных дискоцитов (тромбоцитов) и уменьшает общее число активированных форм тромбоцитов, нормализует вязкость крови, снижает общее число микроагрегантов, таким образом улучшая микроциркуляцию и реологические свойства крови, а также снабжение тканей кислородом и питательными веществами.

Вобэнзим нормализует липидный обмен, снижает синтез эндогенного холестерина, повышает содержание ЛПВП, снижает уровень атерогенных липидов, улучшает всасывание полиненасыщенных жирных кислот.

Вобэнзим повышает эффективность антибиотикотерапии, увеличивая концентрацию антибиотиков в плазме крови и очаге воспаления, а также уменьшает побочные эффекты антибиотиков (дисбактериоз).

Вобэнзим уменьшает выраженность побочных эффектов, связанных с приемом гормональных препаратов (в т.ч. гиперкоагуляцию).

Вобэнзим регулирует механизмы неспецифической защиты (выработка интерферонов), тем самым проявляя противовирусное и противомикробное действие.

### **Фармакокинетика**

После приема Вобэнзима внутрь входящие в состав препарата ферменты всасываются из тонкой кишки путем резорбции интактных молекул и, связываясь с транспортными белками крови, поступают в кровоток. Затем ферменты, мигрируя по сосудистому руслу, накапливаются в зоне патологического процесса.

## **Показания к применению:**

*В составе комплексной терапии:*

- тромбозы (в т.ч. острый тромбоз поверхностных вен), постфлебитический синдром, облитерирующий эндартериит и атеросклероз артерий нижних конечностей, лимфатический отек, профилактика рецидивирующих флебитов;
- цистит, цистопиелит, простатит;
- инфекции, передающиеся половым путем;
- хронические инфекции гениталий, гестозы, мастопатии, аднексит, для снижения частоты и выраженности побочных эффектов заместительной гормональной терапии в гинекологии;
- стенокардия напряжения, подострая стадия инфаркта миокарда (для улучшения реологических свойств крови);
- синусит, бронхит, пневмония;
- панкреатит, гепатит;
- пиелонефрит, гломерулонефрит;
- диабетическая ангиопатия, диабетическая ретинопатия;
- аутоиммунный тиреоидит;
- ревматоидный артрит, реактивный артрит, болезнь Бехтерева;
- атопический дерматит, угревая сыпь;

- рассеянный склероз;
- увеит, иридоциклит, гемофтальм, применение в офтальмохирургии;
- лечение послеоперационных осложнений (воспалительные процессы, тромбозы, отеки), спаечной болезни, посттравматических и лимфатических отеков, пластические и реконструктивные операции;
- травмы, переломы, дисторсии, повреждения связочного аппарата, ушибы, хронические посттравматические процессы, воспаления мягких тканей, ожоги, травмы в спортивной медицине.

**Профилактика:**

- нарушений микроциркуляции, постстрессорных нарушений, а также срыва адаптационных механизмов;
- побочных эффектов заместительной гормональной терапии, гормональной контрацепции;
- при хирургических вмешательствах с целью профилактики инфекционных осложнений и спаечной болезни.

Вобэнзим рекомендуется для профилактики инфекционных осложнений и улучшения качества жизни во время проведения химио- или лучевой терапии; вирусных инфекций и их осложнений.

**Относится к болезням:**

- [Аднексит](#)
- [Ангина](#)
- [Ангиопатия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Атопический дерматоз](#)
- [Бронхит](#)
- [Воспаление](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Гестоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Диабетическая ангиопатия](#)
- [Диабетическая ретинопатия](#)
- [Инфекции](#)
- [Иридоциклит](#)
- [Контрацепция](#)
- [Мастит](#)
- [Мастопатия](#)
- [Миокардит](#)
- [Нарушения микроциркуляции](#)
- [Ожоги](#)
- [Отеки](#)
- [Панкреатит](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Пневмония](#)
- [Простатит](#)
- [Рассеянный склероз](#)
- [Ревматоидный артрит](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Синусит](#)
- [Склерит](#)
- [Стенокардия](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Увеит](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)
- [Флебит](#)
- [Цистит](#)

**Противопоказания:**

- заболевания, связанные с повышенной вероятностью кровотечений (в т.ч. гемофилия, тромбоцитопения);

- проведение гемодиализа;
- детский возраст до 5 лет;
- индивидуальная непереносимость препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Устанавливают индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания.

**Взрослым** в зависимости от активности и тяжести заболевания назначают в дозе от 3 до 10 таб. 3 раза/сут. В первые 3 дня приема препарата рекомендуемая доза составляет 3 таб. 3 раза/сут.

При *средней активности заболевания* препарат назначают в дозе 5-7 таб. 3 раза/сут в течение 2 недель. В дальнейшем дозу препарата следует уменьшить до 3-5 таб. 3 раза/сут. Курс - 2 недели.

При *высокой активности заболевания* препарат назначают в дозе 7-10 таб. 3 раза/сут в течение 2-3 недель. В дальнейшем дозу следует уменьшить до 5 таб. 3 раза/сут. Курс - 2-3 мес.

При *хронических длительно протекающих заболеваниях* Вобэнзим можно применять по показаниям курсами от 3 до 6 мес и более.

С целью *повышения эффективности антибиотиков и профилактики дисбактериоза* Вобэнзим следует применять на протяжении всего курса антибиотикотерапии в дозе по 5 таб. 3 раза/сут. После прекращения курса антибиотикотерапии для восстановления микрофлоры кишечника Вобэнзим следует назначать по 3 таб. 3 раза/сут в течение 2 недель.

Во время *проведения лучевой и химиотерапии* Вобэнзим следует применять в дозе по 5 таб. 3 раза/сут до завершения курса лучевой и химиотерапии с целью предупреждения инфекционных осложнений, улучшения переносимости базисной терапии и повышения качества жизни.

С *профилактической целью* Вобэнзим назначают 3 таб. 3 раза/сут в течение 1.5 мес с повторением курса 2-3 раза в год.

**Детям в возрасте 5-12 лет** назначают в суточной дозе из расчета 1 таб. на 6 кг массы тела. **Детям старше 12 лет** препарат назначают по схеме, предназначенной для взрослых. Длительность лечения определяется индивидуально.

Препарат следует принимать не менее чем за 30 мин до еды, не разжевывая, запивая водой (200 мл).

## **Побочное действие:**

Вобэнзим, как правило, хорошо переносится пациентами. В большинстве случаев побочных эффектов, синдрома отмены, привыкания не наблюдалось даже при длительном применении в высоких дозах.

*В отдельных случаях:* незначительные изменения консистенции и запаха кала, крапивница (проходят при снижении дозы или отмены препарата).

Пациент должен быть предупрежден о том, что при появлении других побочных реакций рекомендуется отменить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Передозировка:**

О случаях передозировки препарата Вобэнзим не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью и под контролем врача следует назначать Вобэнзим при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном приеме Вобэнзима с другими лекарственными средствами случаи несовместимости неизвестны.

## Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что в начале лечения препаратом Вобэнзим возможно обострение симптомов заболевания. В таких случаях рекомендуют временно снизить дозу, лечение прерывать не следует.

При инфекционно-воспалительных заболеваниях Вобэнзим не заменяет лечения антибиотиками, но повышает их эффективность.

Вобэнзим не является допингом.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автомобиля и выполнению работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

При проведении гемодиализа применение противопоказано.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказание: детский возраст до 5 лет.

**Детям в возрасте 5-12 лет** назначают в суточной дозе из расчета 1 таб. на 6 кг массы тела. **Детям старше 12 лет** препарат назначают по схеме, предназначенной для взрослых. Длительность лечения определяется индивидуально.

## Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 2.5 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vobenzim>