

Вокара



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли гомеопатические** в виде прозрачной жидкости с желтоватым оттенком, со специфическим запахом.

	100 мл
шалфей (Salvia) D1	7 мл
белладонна (Belladonna) D6	10 мл
лаконос (Phytolacca) D6	10 мл
яд змеи сурукуку (Lachesis) D12	10 мл
ртуть растворимая по Ганнеману (Mercurius solubilis Hahnemanni) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу.

20 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

50 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

100 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Оказывает противовоспалительное, противомикробное, иммуностимулирующее и дезинтоксикационное действие.

Фармакокинетика

Действие препарата Вокара является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии заболеваний полости рта и глотки в т.ч.:

— тонзиллита;

— фарингита;

- лимфаденита;
- стоматита;
- гингивита.

Относится к болезням:

- [Гингивит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам старше 12 лет препарат назначают по 10 капель 3 раза/сут. Курс лечения - 2-4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 месяц после консультации с врачом.

В случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием каждые 0.5-1 ч, до наступления улучшения (но не более 8 раз), после чего принимать 3 раза/сут.

Принимают внутрь в чистом виде или после разведения в 1 ст. ложке воды за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Вокара при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Вокара с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Вокара содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в детском возрасте

Данные о применении у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют.

Вокара

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Подросткам старше 12 лет препарат назначают по 10 капель 3 раза/сут. Курс лечения - 2-4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 месяц после консультации с врачом.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vokara>