Волекам



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для инфузий прозрачный или слегка опалесцирующий, бесцветный или светло-желтого цвета.

	100 мл
гидроксиэтилкрахмал 200/0.5	6 г

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 9 г, вода д/и - до 1 л.

Теоретическая осмолярность: 309 мОсмоль/л.

100 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (50) - ящики картонные (для стационаров).
100 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (75) - ящики картонные (для стационаров).
100 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (96) - ящики картонные (для стационаров).
250 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (24) - ящики картонные (для стационаров).
250 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (36) - ящики картонные (для стационаров).
250 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (48) - ящики картонные (для стационаров).
500 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (12) - ящики картонные (для стационаров).
500 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (18) - ящики картонные (для стационаров).
500 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (24) - ящики картонные (для стационаров).
1000 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (6) - ящики картонные (для стационаров).
1000 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (9) - ящики картонные (для стационаров).
1000 мл - контейнеры полимерные (1) - мешки полимерные (12) - ящики картонные (для стационаров).

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Плазмозамещающее средство, гидроксиэтилированный крахмал (ГЭК). ГЭК - это высокомолекулярное соединение, состоящее из полимеризованных остатков глюкозы, которое получают путем гидроксиэтилирования амилопектина - природного полисахарида, содержащегося в крахмале картофеля и кукурузы восковой спелости. Амилопектин быстро гидролизуется в крови, время его присутствия в кровеносном русле составляет около 20 мин. Для повышения стабильности и увеличения длительности действия амилопектин подвергают гидроксиэтилированию. Глубина этого процесса характеризуется степенью замещения.

Интенсивность и длительность объемзамещающего действия препаратов ГЭК определяются молекулярной массой и степенью замещения субстанции ГЭК. Чем выше степень замещения, тем дольше сохраняется ГЭК в циркулирующей крови. При соотношении C_2/C_6 более 8 ГЭК метаболизируется в организме значительно медленнее, чем при соотношении менее 8.

Пентакрахмал имеет молекулярную массу около 200 000 дальтон и степень замещения около 0.5; соотношение С

$^2/C_6$,
определяющее особенности замещения, равно 6.

Улучшает реологические свойства крови за счет снижения показателей гематокрита, уменьшает вязкость плазмы, снижает агрегацию эритроцитов, способствует восстановлению нарушенной микроциркуляции.

Депонируется в клетках РЭС, что не имеет клинического значения.

Фармакокинетика

После в/в инфузии пентакрахмал подвергается интенсивному метаболизму, расщепляясь (под действием амилазы сыворотки) до низкомолекулярных фрагментов. Продукты метаболизма с молекулярной массой менее 50 000 дальтон быстро выводятся почками. Около 70% дозы выводится с мочой в течение 24 ч и около 80% - в течение недели.

Показания к применению:

В качестве плазмозамещающего средства при гиповолемии и шоке, связанных с оперативными вмешательствами, ранениями, инфекционными заболеваниями и ожогами; нарушения микроциркуляции; терапевтическая гемодилюция.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Нарушения микроциркуляции
- Шок

Противопоказания:

Гипергидратация, гиперволемия, декомпенсированная сердечная недостаточность, почечная недостаточность с олигурией или анурией, кардиогенный отек легкого, внутричерепные кровотечения, тяжелые нарушения свертываемости крови, повышенная чувствительность к ГЭК.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально в зависимости от возраста, показаний, клинической ситуации. Вводят в виде в/в инфузии.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны крапивница, анафилактические реакции; редко - упорный, но обратимый кожный зуд.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Пентакрахмал противопоказан к применению в I триместре беременности.

В экспериментальных исследованиях установлено, что пентакрахмал не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пентакрахмал несовместим с растворами других лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Аллергия
- Отек Квинке
- Сенная лихорадка

Источник: http://drugs.thead.ru/Volekam