Вольтарен Эмульгель



Код АТХ:

- M02AA15

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Диклофенак

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 1% в тубах по 20 и 50 г, в коробке 1 туба.

Состав:

100 г жировой эмульсии в водном геле содержат

Активное вещество: диклофенак диэтиламина 1,16 г, что соответствует 1 г диклофенака натрия.

Описание:

Гель для наружного применения 1% однородный, кремообразный, от белого до желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВП для наружного применения. Оказывает выраженное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Неизбирательно угнетая ЦОГ-1 и ЦОГ-2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты.

Препарат используется для устранения болевого синдрома и уменьшения отечности, связанной с воспалительным процессом.

Фармакокинетика

При рекомендуемом способе нанесения препарата абсорбируется не более 6% диклофенака.

При нанесении на область пораженного сустава концентрация в синовиальной жидкости выше, чем в плазме.

Показания к применению:

Воспаление мышц, суставов, связок, сухожилий при травмах (ушиб, перенапряжение, растяжение), ревматические заболевания мягких тканей (тендовагинит, бурсит, синдром плечо-кисть, периартропатии), местные проявления дегенеративных заболеваний костей и суставов (остеоартроз периферических суставов, остеохондроз), в частности болевой синдром.

Относится к болезням:

- Бурсит
- Воспаление мышц
- Воспаление связок
- Воспаление суставов
- Воспаление сухожилий
- Остеоартрит
- Остеохондроз
- Периартропатии
- Растяжение
- Синдром плечо-кисть
- Тендовагинит
- Ушибы

Противопоказания:

Гиперчувствительность, в т.ч. к другим НПВС, изопропанолу или пропиленгликолю; бронхиальная астма, крапивница или острый ринит, обусловленные приемом ацетилсалициловой кислоты или др. НПВС, в анамнезе.

Способ применения и дозы:

Местно, наносят на кожу 3–4 раза в сутки и слегка втирают. Необходимое количеств геля зависит от площади болезненной зоны, например, 2–4 г препарата (по объему сопоставимо с размером вишни или грецкого ореха соответственно) достаточно для нанесения на площадь 400–800 $см^2$.

Побочное действие:

Местные: иногда — контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность, появление папул, везикул, пузырей или чешуек);

Системные: в отдельных случаях — фотосенсибилизация, распространенная кожная сыпь, аллергические реакции (в т.ч. бронхоспазм, ангионевротический отек).

Передозировка:

Крайне низкая системная абсорбция активного компонента препарата при наружном применении делает передозировку Вольтарена Эмульгеля практически невозможной.

Симптомы: Однако, при случайном применении 100 г геля, эквивалентного 1000 мг диклофенака, возможно появление нежелательных реакций, аналогичных побочным реакциям.

Лечение: первая помощь заключается в промывании желудка, приеме активированного угля. При необходимости - стационарное лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется (опыт клинического применения при беременности и кормлении грудью отсутствует).

Особые указания и меры предосторожности:

Нельзя наносить на кожные раны или открытые повреждения, следует избегать контакта со слизистыми оболочками. При длительном лечении или аппликации на относительно большую поверхность кожи в течение более 2 нед не исключена возможность возникновения системных побочных реакций (необходим врачебный контроль).

Следует воздержаться от применения препарата в педиатрической практике, поскольку безопасность и эффективность его применения у детей не определены.

Условия хранения:

Список Б: при температуре не выше 30 °С. Не замораживать.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Voltaren_Emulgel