

[Вольтарен Эмульгель](#)



Код АТХ:

- [M02AA15](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диклофенак](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 1% в тубах по 20 и 50 г, в коробке 1 туба.

Состав:

100 г жировой эмульсии в водном геле содержат

Активное вещество: диклофенак диэтиламина 1,16 г, что соответствует 1 г диклофенака натрия.

Описание:

Гель для наружного применения 1% однородный, кремообразный, от белого до желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВП для наружного применения. Оказывает выраженное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Незбирательно угнетая ЦОГ-1 и ЦОГ-2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты.

Препарат используется для устранения болевого синдрома и уменьшения отечности, связанной с воспалительным процессом.

Фармакокинетика

При рекомендуемом способе нанесения препарата абсорбируется не более 6% диклофенака.

При нанесении на область пораженного сустава концентрация в синовиальной жидкости выше, чем в плазме.

Показания к применению:

Воспаление мышц, суставов, связок, сухожилий при травмах (ушиб, перенапряжение, растяжение), ревматические заболевания мягких тканей (тендовагинит, бурсит, синдром плечо-кость, периартропатии), местные проявления дегенеративных заболеваний костей и суставов (остеоартроз периферических суставов, остеохондроз), в частности болевой синдром.

Относится к болезням:

- [Бурсит](#)
- [Воспаление мышц](#)
- [Воспаление связок](#)
- [Воспаление суставов](#)
- [Воспаление сухожилий](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Периартропатии](#)
- [Растяжение](#)
- [Синдром плечо-кость](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность, в т.ч. к другим НПВС, изопропанолу или пропиленгликолю; бронхиальная астма, крапивница или острый ринит, обусловленные приемом ацетилсалициловой кислоты или др. НПВС, в анамнезе.

Способ применения и дозы:

Местно, наносят на кожу 3–4 раза в сутки и слегка втирают. Необходимое количество геля зависит от площади болезненной зоны, например, 2–4 г препарата (по объему сопоставимо с размером вишни или грецкого ореха соответственно) достаточно для нанесения на площадь 400–800 см².

Побочное действие:

Местные: иногда — контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность, появление папул, везикул, пузырей или чешуек);

Системные: в отдельных случаях — фотосенсибилизация, распространенная кожная сыпь, аллергические реакции (в т.ч. бронхоспазм, ангионевротический отек).

Передозировка:

Вольтарен Эмульгель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Крайне низкая системная абсорбция активного компонента препарата при наружном применении делает передозировку Вольтарена Эмульгеля практически невозможной.

Симптомы: Однако, при случайном применении 100 г геля, эквивалентного 1000 мг диклофенака, возможно появление нежелательных реакций, аналогичных побочным реакциям.

Лечение: первая помощь заключается в промывании желудка, приеме активированного угля. При необходимости - стационарное лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется (опыт клинического применения при беременности и кормлении грудью отсутствует).

Особые указания и меры предосторожности:

Нельзя наносить на кожные раны или открытые повреждения, следует избегать контакта со слизистыми оболочками. При длительном лечении или аппликации на относительно большую поверхность кожи в течение более 2 нед не исключена возможность возникновения системных побочных реакций (необходим врачебный контроль).

Следует воздержаться от применения препарата в педиатрической практике, поскольку безопасность и эффективность его применения у детей не определены.

Условия хранения:

Список Б: при температуре не выше 30 °С. Не замораживать.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Voltaren_Emulgel