Вулнузан



Код АТХ:

D11AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

 \Diamond **Мазь для местного и наружного применения** гомогенная, от бледно-желтого до желтого цвета, со специфическим запахом.

	1 r
маточный щелок Поморийского озера	120 мг

Вспомогательные вещества: масло касторовое, тилоза С-30, ланолин безводный, вода дистиллированная.

45 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат природного происхождения для наружного применения, полученный посредством обработки маточного щелока Поморийского озера. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и улучшающее регенерацию тканей действие.

Маточный щелок Поморийского озера содержит макро- и микроэлементы (магний, калий, кальций, натрий, хлор, бром, железо, марганец, медь, кобальт, йод, молибден, цинк, висмут, селен), а также коллоиды, кислоты, щелочи и прочие вещества органического происхождения.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Вулнузан не предоставлены.

Показания к применению:

— гнойные раны различного происхождения: инфицированные, хирургические, поверхностные гнойные процессы (в

т.ч. параректальные и постинъекционные абсцессы), трофические язвы, посттравматические и атеросклеротические раны;

- медикаментозная мацерация кожи;
- изъязвления при болезни Бюргера, варикозные язвы, эрозия шейки матки, трещины соска молочной железы.

Относится к болезням:

- Абсцесс
- Атеросклероз
- Варикоз
- Варикозные язвы
- Раны
- Эрозия шейки матки

Противопоказания:

- беременность;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят слоем толщиной 2-3 мм на всю раневую поверхность и покрывают сверху стерильной повязкой.

При лечении *абсцессов* с большой полостью используют до 10-15 г мази. В начале курса лечения повязки меняют ежедневно, при улучшении состояния раны - через день.

При лечении *трещин соска молочной железы* мазь наносят на область трещины несколько раз в день после кормления ребенка.

При лечении *эрозии шейки матки* тампон с нанесенным на него препаратом вводят во влагалище 1 раз/сут вечером в течение 10-15 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Местные реакции: боль при нанесении на язвы.

Передозировка:

Данные о случаях передозировки препарата Вулнузан не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Назначение препарата в период лактации возможно по показаниям. Применение препарата не мешает кормлению ребенка и не требует прекращения грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Вулнузан не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат при необходимости можно применять с окклюзионными повязками.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vulnuzan