

[Йодамид 300](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Рентгеноконтрастное ионное диагностическое средство. Является трийодсодержащим соединением.

Показания к применению:

Ангиография: аортография, ангиокардиография, периферическая артериография, флебография, селективная ангиография, церебральная ангиография. Урография.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Флебит](#)

Противопоказания:

Непереносимость препаратов йода, гипертиреоз, тяжелые поражения паренхимы печени и почек, активная форма туберкулеза, поражения миокарда, тяжелая артериальная гипертензия, шок, коллапс, значительное повышение индекса протромбина и свертывания крови, тяжелое общее состояние пациента. Флебография противопоказана при острых формах флебита.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы. Вводят в/а, в/в, применяют внутривенное введение и введение в мочевой пузырь.

Побочное действие:

Возможно: ощущение жара, головокружение, тошнота, рвота, тахикардия, цианоз.

В отдельных случаях: аллергические реакции (не выявленные при предварительном исследовании), включая

крапивницу, отек Квинке, бронхоспазм, анафилактические реакции вплоть до развития анафилактического шока.

При *в/в введении* возможны флебит, тромбоз.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует строго соблюдать соответствие определенной лекарственной формы йодамида и показаний к его применению. Необходимо учитывать, что при повышенной чувствительности к препарату или при его передозировке возможны аритмии, фибрилляция желудочков, остановка сердца. При сердечной недостаточности, нарушениях коронарного кровообращения, а также после недавно перенесенного инфаркта миокарда применять только по жизненным показаниям, поскольку введение йодамида в кровяное русло вызывает повышенную нагрузку на сердце. Пациентам, склонным к аллергическим реакциям, в течение нескольких дней до введения йодамида следует назначать антигистаминные препараты.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых поражениях паренхимы почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых поражениях паренхимы печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yodamid_300