

## [Йодантипирин](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Противовирусный препарат, обладает противовоспалительным, иммуностимулирующим и интерферогенным действием.

Наибольшая активность проявляется в отношении вируса клещевого энцефалита.

### Показания к применению:

— клещевой энцефалит (лечение и профилактика у взрослых).

### Относится к болезням:

- [Энцефалит](#)

### Противопоказания:

— гиперчувствительность;  
— гиперфункция щитовидной железы.

### Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды. Для лечения *клещевого энцефалита*: в первые 2 дня - по 0.3 г 3 раза/сут; в третий и четвертый дни - по 0.2 г 3 раза/сут; в последующие 5 дней - по 0.1 г 3 раза/сут.

Профилактически, в случае присасывания клеща, по той же схеме, как при лечении; в случаях возможного присасывания клещей - по 0.2 г весь период пребывания в местах, связанных с опасностью заражения клещевым энцефалитом. Йодантипирин также назначают по 0.2 г 3 раза/сут в течение 2 дней перед посещением мест, связанных с возможностью присасывания клещей. При очаговых формах клещевого энцефалита вначале назначают специфический Ig по обычной схеме, а через 2-3 дня назначают по вышеуказанной схеме. Совместно йодантипирин и противоклещевой Ig не применяют.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции. Отеки. Тошнота.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Yodantipirin>