Йодоксид (свечи)



Код АТХ:

- G01AX11

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Повидон-йод

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Суппозитории вагинальные*** коричневого с буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы, допускается мраморность поверхности.

	1 супп.
повидон-йод (йод в форме комплекса поливинилпирролидон йода)	200 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие— противомикробное.

Блокирует аминогруппы клеточных белков. Препарат обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий (в т.ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка), грибов, вирусов, простейших..

Активное вещество препарата — йод — находится в виде комплекса с поливинилпирролидоном. Повидон относится к йодофорам, которые связывают йод..

Концентрация активного йода — 0,1–1%..

Показания к применению:

— лечение острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний влагалища (трихомонадные, грибковые, вирусные, неспецифические, смешанные инфекции), бактериальный вагинит;

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений перед проведением гинекологических вмешательств (искусственное прерывание беременности, установка и удаление внутриматочной спирали, диатермокоагуляция шейки матки, гистеросальпингография).

Относится к болезням:

- Вагинит
- Диатез
- Инфекции

Противопоказания:

— одновременная терапия радиоактивным йодом;

— герпетиформный дерматит Дюринга;

— аденома щитовидной железы;

— тиреотоксикоз;

— новорожденные;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять при хронической почечной недостаточности.

Способ применения и дозы:

При *острых вагинитах* - по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7 дней, при *подострых и хронических вагинитах* - по 1 суппозиторию 1 раз/сут перед сном в течение 14 дней (независимо от фазы менструального цикла).

Суппозиторий вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине.

Побочное действие:

Аллергические реакции: зуд, гиперемия.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Йодоксид не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата во II и III триместрах беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая

польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

С осторожностью следует применять препарат в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Йодоксид несовместим с дезинфицирующими средствами, препаратами, содержащими ртуть, окислителями, щелочами и веществами с кислой реакцией.

Особые указания и меры предосторожности:

В присутствии крови бактерицидное действие препарата может уменьшаться.

В случае неманифестного гипертиреоза и других заболеваний щитовидной железы (особенно у пожилых больных) препарат применяется только по строгим показаниям и под постоянным врачебным контролем.

Избегать попадания в глаза.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yodoksid_svechi