

[Йодопирон \(порошок\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Порошок для приготовления раствора для наружного применения	100 г
йод	9.4 г
калия йодид	9.3 г
поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский	81.3 г

150 г - пакеты двойные полиэтиленовые (1) - пакеты из черной светонепроницаемой пленки.

150 г - банки полиэтиленовые.

150 г - банки полиэтиленотерифталатовые.

1.5 кг - пакеты двойные полиэтиленовые (1) - пакеты из черной светонепроницаемой пленки.

3 кг - пакеты двойные полиэтиленовые (1) - пакеты из черной светонепроницаемой пленки.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство, при наружном применении оказывает бактерицидное (в отношении широкою спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. антибиотикорезистентных штаммов кишечной палочки, золотистого стафилококка и протей), фунгицидное и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

- обеззараживание рук хирурга, операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров;
- ожоги;
- гнойные и инфицированные раны;
- остеомиелит.

Относится к болезням:

- [Остеомиелит](#)
- [Раны](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Наружно. Порошок йодопирона содержит 6-8% активного йода. 1% раствор готовят в аптечных условиях. 0.1-0.5% растворы готовят непосредственно перед употреблением из 1% раствора. В качестве кожного антисептика для обработки рук хирурга применяют 0.1% (по активному йоду) растворы (5 мл); операционное поле протирают салфеткой, смоченной в растворе; при обширных ожогах больного погружают в ванну с раствором 1:32 или 1:50 на 10-15 мин. Для комплексного лечения гнойных ран, обеззараживания операционного поля и обработки локтевых сгибов доноров - 0.5% и 1% (по активному йоду) растворы йодопирона.

Побочное действие:

Сухость кожи, кожный зуд. Аллергические реакции (гиперемия кожи, крапивница). При нанесении на обширную раневую поверхность возможно быстропроходящее жжение, которое вскоре исчезает.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yodopiron_poroshok