Йодопирон (порошок)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления раствора для наружного применения***	**100 г**
йод	9.4 г
калия йодид	9.3 г
поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский	81.3 г

150 г - пакеты двойные полиэтиленовые (1) - пакеты из черной светонепроницаемой пленки.
150 г - банки полиэтиленовые.
150 г - банки полиэтилентерефталатовые.
1.5 кг - пакеты двойные полиэтиленовые (1) - пакеты из черной светонепроницаемой пленки.
3 кг - пакеты двойные полиэтиленовые (1) - пакеты из черной светонепроницаемой пленки.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство, при наружном применении оказывает бактерицидное (в отношении широкою спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. антибиотикорезистентных штаммов кишечной палочки, золотистого стафилококка и протея), фунгицидное и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

— обеззараживание рук хирурга, операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров;

— ожоги;

— гнойные и инфицированные раны;

— остеомиелит.

Относится к болезням:

- Остеомиелит
- Раны

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Наружно. Порошок йодопирона содержит 6-8% активного йода. 1% раствор готовят в аптечных условиях. 0.1-0.5% растворы готовят непосредственно перед употреблением из 1% раствора. В качестве кожного антисептика для обработки рук хирурга применяют 0.1% (по активному йоду) растворы (5 мл); операционное поле протирают салфеткой, смоченной в растворе; при обширных ожогах больного погружают в ванну с раствором 1:32 или 1:50 на 10-15 мин. Для комплексного лечения гнойных ран, обеззараживания операционного поля и обработки локтевых сгибов доноров - 0.5% и 1% (по активному йоду) растворы йодопирона.

Побочное действие:

Сухость кожи, кожный зуд. Аллергические реакции (гиперемия кожи, крапивница). При нанесении на обширную раневую поверхность возможно быстропроходящее жжение, которое вскоре исчезает.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yodopiron_poroshok