

## Йохимбина гидрохлорид



### **Код АТХ:**

- [G04BE04](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Йохимбина гидрохлорид](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Альфа-адреноблокатор, влияет преимущественно на пресинаптические центральные и периферические  $\alpha_2$ -адренорецепторы. Усиливает приток крови к органам малого таза (в т.ч. к половым органам). Повышает либидо и потенцию. Оказывает антидиуретическое действие, вызывает увеличение ЧСС и АД.

#### **Фармакокинетика**

Быстро и полностью абсорбируется из ЖКТ.  $C_{max}$  достигается через 1.3 ч. Через 10 мин после приема внутрь проникает через ГЭБ и обнаруживается в спинномозговой жидкости, около 17% определяется в тканях головного мозга в течение 6 ч. Метаболизируется в печени.  $T_{1/2}$  - 0.6 ч.

### **Показания к применению:**

Лечение психогенной и функциональной импотенции, атония мочевого пузыря, климакс у мужчин.

### **Относится к болезням:**

- [Импотенция](#)

### **Противопоказания:**

## **Йохимбина гидрохлорид**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Артериальная гипертензия, ИБС, заболевания печени и/или почек, повышенная чувствительность к иохимбину, артериальная гипотензия, одновременный прием адреностимуляторов.

### **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь по 5 мг 3 раза/сут. Курс лечения - 1 мес.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* состояние повышенного возбуждения, тремор рук.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется сочетать с антидепрессантами и другими средствами, влияющими на настроение.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, психических заболеваниях.

Следует контролировать пациентов с возможным риском внезапного снижения АД и развития тахикардии.

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при заболеваниях почек.

#### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при заболеваниях печени.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Yohimbina\\_gidrochlorid](http://drugs.thead.ru/Yohimbina_gidrochlorid)