Йокс-Тева



Код АТХ:

- A01AD

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аллантоин
- Повидон-йод

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Спрей для местного применения*** в виде прозрачной или слабо опалесцирующей жидкости красно-коричневого цвета, неограниченно смешивающейся с водой.

	1 мл	**1 фл.**
повидон-йод	85 мг	2.55 г
аллантоин	1 мг	30 мг

Вспомогательные вещества: левоментол - 0.3 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.06 г, натрия цитрата дигидрат - 0.06 г, этанол 96% - 6 г, пропиленгликоль - 9 г, вода очищенная - до 30 мл.

30 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с механическим распылителем, крышкой и аппликатором - пачки картонные.
30 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с механическим распылителем, крышкой и аппликатором с поворотным рычагом - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в т.ч. ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты;

— для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде;

— для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии;

— при стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

Относится к болезням:

- Ангина
- Инфекции
- Стоматит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз);

— сердечная недостаточность;

— герпетиформный дерматит Дюринга;

— одновременное применение радиоактивного йода;

— детский возраст до 8 лет;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к йоду и к другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют 2-4 раза/сут, по одному впрыскиванию направо и налево в полость рта и глотки. При необходимости препарат можно применять более часто, через каждые 4 ч.

Перед применением следует снять защитный колпачок и установить аппликатор. Нажать 2-3 раза на аппликатор, чтобы раствор поступил в распылитель и после нажима разбрызгивался. После этого поместить трубку аппликатора на 2-3 см в полость рта, задержать дыхание и нажать 2 раза на колпачок так, чтобы одно орошение было сделано направо, а второе - налево. Аппликатор до и после применения промывают горячей водой.

Побочное действие:

В отдельных случаях: реакции повышенной чувствительности к препарату, местные проявления аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что может потребовать отмены препарата.

При длительном применении (более 7-10 дней) возможны явления йодизма (в т.ч. металлический вкус во рту, повышенное слюнотечение, отеки глаз, гортани).

Передозировка:

Данные о передозировке препарат Йокс не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нецелесообразно одновременное применение препарата Йокс с другими антисептическими средствами для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащие перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациент должен быть предупрежден о необходимости прекратить прием препарата и обратиться к врачу при появлении признаков йодизма.

Препарат не предназначен для приема внутрь, его не следует вдыхать или проглатывать.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yoks-Teva