

## Йокс-Тева (раствор)



### Код АТХ:

- [A01AD](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аллантоин](#)
- [Повидон-йод](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

◇ **Раствор для местного применения** красно-коричневого цвета, прозрачный или слабо опалесцирующий, неограниченно смешивающийся с водой.

	1 мл	1 фл.
повидон-йод	85 мг	4.25 г
аллантоин	1 мг	50 мг

Вспомогательные вещества: левоментол - 0.5 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.1 г, натрия цитрата дигидрат - 0.1 г, этанол 96% - 10 г, пропиленгликоль - 15 г, вода очищенная - 50 г.

50 мл - флаконы темного стекла с мерным колпачком (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения при заболеваниях полости рта и в ЛОР-практике. При контакте с кожей выделяет йод. Оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Обладает широким спектром противомикробного действия. *Активен в отношении* бактерий, вирусов, грибов, простейших.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Йокс не предоставлены.

## Показания к применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в т.ч. ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты;
- для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде;
- для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии;
- при стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

## Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Инфекции](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

## Противопоказания:

- нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз);
- сердечная недостаточность;
- герпетиформный дерматит Дюринга;
- одновременное применение радиоактивного йода;
- детский возраст до 6 лет;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к йоду и к другим компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют для полоскания полости рта и глотки 2-4 раза/сут. При необходимости препарат можно применять более часто - до 6 раз/сут. Минимальные интервалы между полосканиями - 4 ч.

Перед использованием раствор препарата разбавить водой в соотношении 1:20-1:40 (т.е. от 2.5 мл до 5 мл с помощью вложенного в упаковку мерного колпачка или 1/2-1 чайную ложку в 100 мл воды). Разведенным раствором полоскать полость рта и глотки.

## Побочное действие:

*В отдельных случаях:* реакции повышенной чувствительности к препарату, местные проявления аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что может потребовать отмены препарата.

*При длительном применении:* возможны явления йодизма (в т.ч. металлический вкус во рту, повышенное слюноотечение, отеки глаз, гортани).

## Передозировка:

Данные о передозировке препарат Йокс не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Нецелесообразно одновременное применение препарата Йокс с другими антисептическими средствами для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащие перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациент должен быть предупрежден о необходимости прекратить прием препарата и обратиться к врачу при появлении признаков йодизма.

Препарат не предназначен для приема внутрь, его не следует вдыхать или проглатывать.

Препарат содержит около 19% этанола.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 10° до 25°С.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Yoks-Teva\\_rastvor](http://drugs.thead.ru/Yoks-Teva_rastvor)