

## Йокс (спрей)



### Код АТХ:

- [R02AA](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аллантоин](#)
- [Повидон-йод](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей для местного применения** в виде прозрачной или слабо опалесцирующей жидкости красно-коричневого цвета, неограниченно смешивающейся с водой.

	<b>1 мл</b>	<b>1 фл.</b>
повидон-йод	85 мг	2.55 г
аллантоин	1 мг	30 мг

*Вспомогательные вещества:* левоментол - 0.3 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.06 г, натрия цитрата дигидрат - 0.06 г, этанол 96% - 6 г, пропиленгликоль - 9 г, вода очищенная - до 30 мл.

30 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с механическим распылителем, крышкой и аппликатором - пачки картонные.  
30 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с механическим распылителем, крышкой и аппликатором с поворотным рычагом - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения при заболеваниях полости рта и в ЛОР-практике. При контакте с кожей выделяет йод. Оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Обладает широким спектром противомикробного действия. *Активен в отношении* бактерий, вирусов, грибов, простейших.

#### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Йокс не предоставлены.

## Показания к применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в т.ч. ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты;
- для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде;
- для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии;
- при стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

## Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Инфекции](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

## Противопоказания:

- нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз);
- сердечная недостаточность;
- герпетиформный дерматит Дюринга;
- одновременное применение радиоактивного йода;
- детский возраст до 8 лет;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к йоду и к другим компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют 2-4 раза/сут, по одному впрыскиванию направо и налево в полость рта и глотки. При необходимости препарат можно применять более часто, через каждые 4 ч.

Перед применением следует снять защитный колпачок и установить аппликатор. Нажать 2-3 раза на аппликатор, чтобы раствор поступил в распылитель и после нажима разбрызгивался. После этого поместить трубку аппликатора на 2-3 см в полость рта, задержать дыхание и нажать 2 раза на колпачок так, чтобы одно орошение было сделано направо, а второе - налево. Аппликатор до и после применения промывают горячей водой.

## Побочное действие:

*В отдельных случаях:* реакции повышенной чувствительности к препарату, местные проявления аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что может потребовать отмены препарата.

*При длительном применении* (более 7-10 дней) возможны явления йодизма (в т.ч. металлический вкус во рту, повышенное слюноотечение, отеки глаз, гортани).

## Передозировка:

Данные о передозировке препарат Йокс не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Нецелесообразно одновременное применение препарата Йокс с другими антисептическими средствами для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащие перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациент должен быть предупрежден о необходимости прекратить прием препарата и обратиться к врачу при появлении признаков йодизма.

Препарат не предназначен для приема внутрь, его не следует вдыхать или проглатывать.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано применение у детей в возрасте до 8 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°С.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Yoks\\_sprey](http://drugs.thead.ru/Yoks_sprey)