Югланэкс



Код АТХ:

- A13A

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Экстракт для приема внутрь (жидкий) 100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Состав:

100 мл раствора содержат

Активное вещество: свежие плоды грецкого ореха 90 г

Вспомогательные вещества: этанол, эфирные масла, эллаговую и галловую кислоты, каротиноиды, нафтохинон, флавоноиды (кверцетин, катехин, гиперозид, кемпферол), витамин С, витамины группы В, микроэлементы.

Описание:

Экстракт для приема внутрь (жидкий) в виде жидкости темно-коричневого цвета с зеленоватым или красноватым оттенком, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Югланэкс оказывает противовоспалительное действие и вызывает уменьшение сосудистой проницаемости за счет умеренного торможения экссудативной реакции при воспалении вследствие ингибирования 5-липооксигеназы и связанным с ним торможением синтеза лейкотриенов С4 и D4. Низкомолекулярные антиоксиданты (аскорбинаты, кверцетин, нафтохинон, юглон) угнетают активность циклооксигеназы и оказывают противовоспалительное действие.

Противоотечное действие обусловлено суммарным эффектом Югланэкса, связанного с Р-витаминной активностью его компонентов, которые снижают проницаемость капилляров, увеличивают их резистентность, улучшают микроциркуляцию за счет ингибирования выделения гистамина на уровне посткапиллярных венул и закрытия межэндотелиальных клеточных соединений.

Суммарно активные компоненты составляют неферментативную систему антиоксидантной защиты, принимают участие в ферментативном окислении аскорбиновой кислоты, усиливая эффект последней.

Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии хронических заболеваний вен:

— варикозная болезнь нижних конечностей;

— посттромботическая болезнь нижних конечностей;

— ангиоплазия (флебодисплазия).

В составе комплексной терапии хронической венозной недостаточности, обусловленной нарушением венозного оттока:

— отеки;

— боль;

— венозная хромота;

— трофические язвы.

Относится к болезням:

- Ангиоплазия
- Варикозная болезнь
- Отеки
- Посттромботическая болезнь
- Трофические язвы
- Флебодисплазия

Противопоказания:

Препарат нерекомендован к применению в следующих ситуациях:

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1 чайной ложке 3 раза/сут. Экстаркт следует разводить в 1/4 стакана воды и принимать после еды.

Курс лечения - 3-4 недели. При необходимости возможно увеличение продолжительности терапии и проведение повторных курсов.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о передозировке препарата нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия Югланэкса с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата следует учитывать, что в его составе содержится 50-60% этанола. Препарат влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре 8–15 °С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yuglaneks