

Юниэнзим с МПС



Код АТХ:

- [A09AA02](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Таблетки, покрытые оболочкой** (сахарной) черного цвета, овальные, с белой надписью "Юникем" на одной стороне.

	1 таб.
грибковая диастаза	20 мг
папаин	30 мг
симетикон	50 мг
активированный уголь	75 мг
никотинамид	25 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, акации порошок, кальция гидрофосфат, желатин, тальк, магния стеарат, натрия кармеллоза, шеллак, сахароза, титана диоксид, касторовое масло, кальция карбонат, уголь древесный, натрия бензоат, воск, воск карнаубский.

10 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Пищеварительный ферментный препарат с компонентом, уменьшающим метеоризм.

Папаин и грибковая диастаза являются пищеварительными ферментами, облегчающими переваривание и усвоение в организме белков, жиров и углеводов.

Симетикон затрудняет образование и способствует разрушению газовых пузырьков, облегчает выведение газов из кишечника, тем самым уменьшает вздутие живота, тошноту, боли и дискомфорт, вызванные метеоризмом.

Активированный уголь адсорбирует газы и токсины, образующиеся при расстройствах пищеварения.

Никотинамид (витамин РР) нормализует моторику желудочно-кишечного тракта.

Фармакокинетика

Терапевтический эффект препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

—в составе комплексной терапии состояний, сопровождающихся нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, заболевания печени);

—метеоризм (в т.ч. в послеоперационном периоде), чувство переполнения желудка, тошнота, отрыжка, обусловленные непривычной пищей или перееданием.

Относится к болезням:

- [Метеоризм](#)
- [Отрыжка](#)
- [Тошнота](#)

Противопоказания:

—острый панкреатит;

—острые заболевания ЖКТ;

—повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 таб. 1-2 раза/сут после приема пищи.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, покраснение кожи (особенно лица и шеи).

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата Юниэнзим с МПС отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует назначать препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Юниэнзим с МПС

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Лекарственное взаимодействие препарата Юниэнзим с МПС не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациент должен быть информирован, что в случае ухудшения самочувствия или появления побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yunienzim_s_MPS