

Залаин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 2%** белый, мягкий, без запаха или со слабым запахом жира.

	1 г
сертаконазола нитрат	20 мг

Вспомогательные вещества: этиленгликоля и полиэтиленгликоля пальмитостеарат - 20 г, глицериды полиглицолизированные насыщенные - 5 г, глицерола изостеарат - 2 г, масло парафиновое - 8 г, метил п-гидроксibenзоат - 0.1 г, сорбиновая кислота - 0.1 г, вода очищенная - до 100 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат широкого спектра действия, производное имидазола и бензотиофена.

Активен в отношении патогенных грибов *Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida spp.*, *Pityrosporum orbiculare*, дерматофитов *Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.* и возбудителей инфекций кожи и слизистых оболочек (грамположительных штаммов *Streptococcus spp.* и *Staphylococcus spp.*).

Обладает фунгистатическим и фунгицидным действием в терапевтических дозах.

Механизм действия сертаконазола заключается в угнетении синтеза эргостерола (основного стерола мембран грибов и дрожжей), и увеличении проницаемости клеточной мембраны, что приводит к лизису клетки гриба.

Фармакокинетика

При местном применении сертаконазола нитрат в крови и моче не обнаруживается.

Показания к применению:

Поверхностные микозы кожи:

- микозы голеней, стоп и кистей;
- микозы туловища;
- микозы бороды;
- кандидоз;
- разноцветный лишай.

Относится к болезням:

- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Разноцветный лишай](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к сертаконазолу, производным имидазола или другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Крем следует наносить на пораженные участки кожи равномерным тонким слоем 2 раза/сут с захватом примерно 1 см поверхности здоровой кожи.

Продолжительность лечения зависит от этиологии возбудителя и локализации инфекции. Симптомы заболевания исчезают, как правило, через 2-4 недели. Рекомендуемая продолжительность лечения - 4 недели.

Побочное действие:

Местные реакции: контактный дерматит.

Возможны быстро проходящие эритематозные реакции, не требующие отмены препарата.

Передозировка:

Учитывая наружный способ применения, передозировка препарата Залаин маловероятна. При случайном приеме препарата внутрь показано симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

У беременных женщин безопасность препарата специально не изучалась. Применение препарата при беременности возможно только в случаях, когда предполагаемая польза терапии для матери превосходит потенциальный риск для плода.

В период лактации не следует наносить крем на молочные железы. Данных о применении препарата в период лактации в настоящее время нет, поэтому при необходимости назначения препарата матери в период лактации следует индивидуально решать вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Залаин с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не применяется в офтальмологической практике.

Не рекомендуется использование кислотных моющих средств (в кислой среде усиливается размножение грибов *Candida spp.*).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Zalain>