

[Залаин \(свечи\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории вагинальные** белого цвета, овальной формы, воскообразные.

	1 супп.
сертраконазола нитрат	300 мг

Вспомогательные вещества: витепсол - 1.305 г, суппоцир - 1.305 г, кремния диоксид коллоидный безводный - 0.09 г.

1 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат, производное имидазола и бензотиафена. В терапевтических дозах оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола и увеличении проницаемости клеточной мембраны, что приводит к лизису клетки гриба.

Активен в отношении *Candida spp.*. Обладает также антибактериальной активностью в отношении грамположительных бактерий (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*).

Фармакокинетика

При интравагинальном применении препарат не всасывается.

Показания к применению:

— местное лечение инфекций слизистой оболочки влагалища, вызываемых грибами рода *Candida* (кандидозный вульвовагинит).

Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к производным имидазола, бензотифена и другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют однократно. 1 вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, лежа на спине, перед сном. В случае сохранения клинических симптомов возможно повторное применение препарата через 7 дней.

Перед применением препарата следует обмыть наружные половые органы с использованием нейтрального или щелочного мыла.

Побочное действие:

Редко: ощущение жжения, зуд во влагалище, которые проходят самостоятельно во время лечения и не требуют отмены препарата. Эти побочные эффекты являются классическими для препаратов местного применения и отражают эффективность применения препарата.

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Не установлена.

При случайном приеме препарата внутрь необходимо промыть желудок и немедленно обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточных данных о применении Залаина при беременности и в период лактации нет.

Учитывая способ применения препарата (однократное введение), а также отсутствие системной абсорбции, применение Залаина при беременности и в период лактации возможно в том случае, если предполагаемая польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата Залаин с местными контрацептивами может наблюдаться ослабление спермицидного действия последних.

Особые указания и меры предосторожности:

При одновременной инфекции половых губ и прилегающих участков (кандидозный вульвит) следует дополнительно проводить местное лечение препаратом Залаин крем.

Лечение можно проводить во время менструации.

При применении препарата рекомендуется воздерживаться от половых контактов.

Для предотвращения урогенитальной реинфекции рекомендуется рассмотреть вопрос об одновременном лечении полового партнера.

Залаин (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Риск повреждения средств барьерной контрацепции (разрыв презерватива или диафрагмы) увеличивается при их одновременном использовании с Залаином.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение Залаина не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих высокой концентрации внимания и скорости психомоторных реакций (в т.ч. вождение транспортных средств).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zalain_svechi