

[Зеленина Капли](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения.

Белладонны лист оказывает м-холиноблокирующее и спазмолитическое действие. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина; уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Снижает тонус мышц ЖКТ, желчных протоков и желчного пузыря; вызывает тахикардию, улучшает AV-проводимость. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации.

Ландыша настойка оказывает кардиотоническое действие.

Валерианы корневище с корнями обладает седативным и спазмолитическим действием. Облегчает наступление естественного сна. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен. Оказывает желчегонное действие, увеличивает секрецию слизистой оболочки ЖКТ, замедляет сердечный ритм, расширяет коронарные сосуды. Действие на деятельность миокарда опосредовано через нейрорегуляторные механизмы и прямое влияние на автоматизм и проводящую систему сердца.

Ментол - местнораздражающее средство, оказывает вентонизирующее, анальгезирующее, рефлекторное коронародилатирующее и антиангинальное действие.

Показания к применению:

- функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы;
- повышенная нервная возбудимость;
- хроническая сердечная недостаточность (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Сердечная недостаточность](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;

Зеленина Капли

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- закрытоугольная глаукома;
- эндокардит;
- миокардит.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь по 20-25 капель 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции, мышечная слабость, головная боль.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных лекарственных средств и средств, угнетающих ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими, потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zelenina_Kapli