

## Жекатон



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|   |       |
|---|-------|
| Экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий | 1 л   |
| экстракт цветков календулы                              | 250 г |
| экстракт цветков ромашки аптечной                       | 500 г |
| экстракт травы тысячелистника                           | 250 г |

30 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения ЖеКаТон оказывает противовоспалительное действие, обладает гемостатическими и спазмолитическими свойствами.

#### Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

### Показания к применению:

*В стоматологии:*

— ЖеКаТон применяют у взрослых при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта различной этиологии и пародонта, таких как афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит.

*В гастроэнтерологии:*

— препарат применяют в комплексном лечении при гастродуоденитах, хронических энтеритах и колитах.

### Относится к болезням:

- [Гастрит](#)

- [Гастродуоденит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Гингивит](#)
- [Колит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Энтерит](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- возраст до 18 лет;
- нарушения функции печени;
- тяжелые нарушения функции почек;
- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга.

*С осторожностью:*

при приеме внутрь - нарушение функции почек легкой и средней степени тяжести, гломерулонефрит, пиелонефрит.

## Способ применения и дозы:

ЖеКаТон применяют местно, внутрь и ректально в виде водного раствора, который перед применением готовят путем добавления 5 мл (1 чайная ложка) препарата в 200 мл (1 стакан) теплой кипяченой воды. При условии хорошей переносимости препарата, дозу можно увеличить до 15 мл (3 чайные ложки) на 1 стакан теплой кипяченой воды.

Суточная доза препарата составляет от 10 до 15 мл (2-3 чайные ложки). Максимальная суточная доза препарата составляет 30 мл (6 чайных ложек).

*Местно: при заболеваниях слизистой оболочки полости рта* раствор препарата применяют путем аппликаций (15-20 минут) или ротовых полосканий в течение 1-2 минут, 2-3 раза в день. Курс лечения 2-5 дней. *Лечение пародонта* проводят после удаления зубного камня и выскабливания патологических десневых карманов. В десневые карманы на 20 мин вводят тонкие турунды, обильно смоченные водным раствором препарата. Процедуру проводят 1 раз в сутки ежедневно или через день. Продолжительность лечения составляет 4-6 процедур.

*Внутрь (в гастроэнтерологии):* водный раствор препарата принимают по 60-100 мл (1/3-1/2 стакана) за 30 мин до еды или через 40-60 мин после еды, 3-4 раза в день. Курс лечения - 2-3 недели.

*Ректально (в гастроэнтерологии):* водный раствор препарата в объеме 50-100 мл, применяют 1-2 раза в сутки в виде микроклизм, после очистительной клизмы. Курс лечения 3-6 дней.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При появлении указанных выше побочных эффектов, прекратите применение препарата и как можно скорее обратитесь к врачу.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

В настоящее время не установлено клинически значимых взаимодействий препарата ЖеКаТон при совместном применении его с другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Содержание этанола в препарате составляет не менее 33%. Разовая доза препарата (1/3-1/2 чайной ложки) содержит до 0,651 г абсолютного спирта.

Суточная доза препарата (2-3 чайные ложки) содержит до 3,906 г абсолютного спирта.

Максимальная суточная доза (до 6 чайных ложек) содержит 7,812 г абсолютного спирта.

Не следует превышать указанную суточную дозу.

Перед применением взбалтывать.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:*

В период лечения препаратом ЖеКаТон необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

Прием препарата противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек.

### **При нарушениях функции печени**

Прием препарата противопоказан пациентам с нарушением функции печени.

### **Применение в детском возрасте**

Препарат противопоказан детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/ZheKaTon>