Жекатон



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий***	**1 л**
экстракт цветков календулы	250 г
экстракт цветков ромашки аптечной	500 г
экстракт травы тысячелистника	250 г

30 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения ЖеКаТон оказывает противовоспалительное действие, обладает гемостатическими и спазмолитическими свойствами.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

В стоматологии:

— ЖеКаТон применяют у взрослых при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта различной этиологии и пародонта, таких как афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит.

В гастроэнтерологии:

— препарат применяют в комплексном лечении при гастродуоденитах, хронических энтеритах и колитах.

Относится к болезням:

- Гастрит

- Гастродуоденит
- Гастроэнтерит
- Гингивит
- Колит
- Пародонтит
- Стоматит
- Энтерит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;

— возраст до 18 лет;

— нарушения функции печени;

— тяжелые нарушения функции почек;

— алкоголизм;

— черепно-мозговая травма;

— заболевания головного мозга.

С осторожностью:

при приеме внутрь - нарушение функции почек легкой и средней степени тяжести, гломерулонефрит, пиелонефрит.

Способ применения и дозы:

ЖеКаТон применяют местно, внутрь и ректально в виде водного раствора, который перед применением готовят путем добавления 5 мл (1 чайная ложка) препарата в 200 мл (1 стакан) теплой кипяченой воды. При условии хорошей переносимости препарата, дозу можно увеличить до 15 мл (3 чайные ложки) на 1 стакан теплой кипяченой воды.

Суточная доза препарата составляет от 10 до 15 мл (2-3 чайные ложки). Максимальная суточная доза препарата составляет 30 мл (6 чайных ложек).

Местно: при заболеваниях слизистой оболочки полости рта раствор препарата применяют путем аппликаций (15-20 минут) или ротовых полосканий в течение 1-2 минут, 2-3 раза в день. Курс лечения 2-5 дней. *Лечение пародонта* проводят после удаления зубного камня и выскабливания патологических десневых карманов. В десневые карманы на 20 мин вводят тонкие турунды, обильно смоченные водным раствором препарата. Процедуру проводят 1 раз в сутки ежедневно или через день. Продолжительность лечения составляет 4-6 процедур.

Внутрь (в гастроэнтерологии): водный раствор препарата принимают по 60-100 мл (1/3-1/2 стакана) за 30 мин до еды или через 40-60 мин после еды, 3-4 раза в день. Курс лечения - 2-3 недели.

Ректально (в гастроэнтерологии): водный раствор препарата в объеме 50-100 мл, применяют 1-2 раза в сутки в виде микроклизм, после очистительной клизмы. Курс лечения 3-6 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При появлении указанных выше побочных эффектов, прекратите применение препарата и как можно скорее обратитесь к врачу.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время не установлено клинически значимых взаимодействий препарата ЖеКаТон при совместном применении его с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержание этанола в препарате составляет не менее 33%. Разовая доза препарата (1/3-1/2 чайной ложки) содержит до 0,651 г абсолютного спирта.

Суточная доза препарата (2-3 чайные ложки) содержит до 3,906 г абсолютного спирта.

Максимальная суточная доза (до 6 чайных ложек) содержит 7,812 г абсолютного спирта.

Не следует превышать указанную суточную дозу.

Перед применением взбалтывать.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

В период лечения препаратом ЖеКаТон необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Прием препарата противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек.

При нарушениях функции печени

Прием препарата противопоказан пациентам с нарушением функции печени.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zhekaton