

## [Желчегонный Сбор](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### ***Фармакодинамика***

Оказывает желчегонное, противовоспалительное и спазмолитическое действие. Повышает аппетит, нормализует моторику ЖКТ.

### **Показания к применению:**

- хронический холецистит;
- хронический реактивный гепатит;
- холангит;
- диспепсические расстройства на фоне нарушения желчеотделения (снижение аппетита, тошнота);
- дискинезия желчевыводящих путей;
- постхолецистэктомический синдром.

### **Относится к болезням:**

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Диспепсия](#)
- [Тошнота](#)
- [Холангит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

### **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- холелитиаз.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, по 100 мл 3 раза/сут за 30 мин до еды в течение 2-4 нед.

4 г (1 ст.ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей воды, нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, настаивают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают, полученный настой доводят кипяченой водой до объема 200 мл. Перед употреблением взбалтывают.

### **Побочное действие:**

Изжога. Аллергические реакции.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Готовый настой хранят в прохладном месте не более 48 ч.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Zhelchegonnyy\\_Sbor](http://drugs.thead.ru/Zhelchegonnyy_Sbor)