# Женьшень С Витамином С



#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

#### Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
экстракт корня женьшеня	250 мг
аскорбиновая кислота	50 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Стимулирует ЦНС. Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гинсенозидов (панаксазиды А и В, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел, стеролов, пептидов, витамина С.

#### Показания к применению:

- для повышения работоспособности при повышенных физических и умственных нагрузках;
- период восстановления после перенесенных заболеваний;
- астенические состояния различной этиологии.

#### Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения

# Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- повышенная нервная возбудимость;

#### Женьшень С Витамином С

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

— острый период инфекционных заболеваний;
— эпилепсия;
— детский возраст до 15 лет;
— период беременности и грудного вскармливания;
— бессонница;
— кровоточивость;
— нарушения сна;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

**Взрослые и дети старше 15 лет:** по 1 таблетке в день (в первой половине дня). Курс - 4-8 недель. Повторный курс - по рекомендации врача.

#### Побочное действие:

Аллергические реакции, нарушения со стороны ЖКТ (диарея, тошнота, рвота); тахикардия, головная боль, бессонница, повышение артериального давления, повышенная нервная возбудимость, носовое кровотечение, гипогликемия.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется принимать в период беременности и грудного вскармливания.

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препараты женьшеня усиливают действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора и др.), варфарина; являются антагонистами средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств); усиливают эффект гипогликемических лекарственных средств; повышают риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

### Особые указания и меры предосторожности:

Во избежании нарушений сна, препарат не рекомендуется принимать во второй половине дня.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 15 лет.

#### Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

#### Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Женьшень С Витамином С Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Zhenshen\_S\_Vitaminom\_S