

[Женьшень С Витамином С](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
экстракт корня женьшеня	250 мг
аскорбиновая кислота	50 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Стимулирует ЦНС. Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гинсенозидов (панаксазиды А и В, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел, стеролов, пептидов, витамина С.

Показания к применению:

- для повышения работоспособности при повышенных физических и умственных нагрузках;
- период восстановления после перенесенных заболеваний;
- астенические состояния различной этиологии.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)

Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- повышенная нервная возбудимость;

Женьшень С Витамином С

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- острый период инфекционных заболеваний;
- эпилепсия;
- детский возраст до 15 лет;
- период беременности и грудного вскармливания;
- бессонница;
- кровоточивость;
- нарушения сна;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 15 лет: по 1 таблетке в день (в первой половине дня). Курс - 4-8 недель. Повторный курс - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции, нарушения со стороны ЖКТ (диарея, тошнота, рвота); тахикардия, головная боль, бессонница, повышение артериального давления, повышенная нервная возбудимость, носовое кровотечение, гипогликемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется принимать в период беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препараты женьшеня усиливают действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора и др.), варфарина; являются антагонистами средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств); усиливают эффект гипогликемических лекарственных средств; повышают риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Особые указания и меры предосторожности:

Во избежании нарушений сна, препарат не рекомендуется принимать во второй половине дня.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 15 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Женьшень С Витамином С

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zhenshen_S_Vitaminom_S