Женьшень С Витамином С



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки	**1 таб.**
экстракт корня женьшеня	250 мг
аскорбиновая кислота	50 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Стимулирует ЦНС. Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гинсенозидов (панаксазиды А и В, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел, стеролов, пептидов, витамина С.

Показания к применению:

— для повышения работоспособности при повышенных физических и умственных нагрузках;

— период восстановления после перенесенных заболеваний;

— астенические состояния различной этиологии.

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения

Противопоказания:

— артериальная гипертензия;

— повышенная нервная возбудимость;

— острый период инфекционных заболеваний;

— эпилепсия;

— детский возраст до 15 лет;

— период беременности и грудного вскармливания;

— бессонница;

— кровоточивость;

— нарушения сна;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 15 лет: по 1 таблетке в день (в первой половине дня). Курс - 4-8 недель. Повторный курс - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции, нарушения со стороны ЖКТ (диарея, тошнота, рвота); тахикардия, головная боль, бессонница, повышение артериального давления, повышенная нервная возбудимость, носовое кровотечение, гипогликемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется принимать в период беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препараты женьшеня усиливают действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора и др.), варфарина; являются антагонистами средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств); усиливают эффект гипогликемических лекарственных средств; повышают риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Особые указания и меры предосторожности:

Во избежании нарушений сна, препарат не рекомендуется принимать во второй половине дня.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 15 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 20°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zhenshen_S_Vitaminom_S