Жостера Слабительного Плоды



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство растительного происхождения. Антрагликозиды - эфироподобные соединения, после отщепления сахара образуют эмодин и др. производные антрацена. Раздражает интерорецепторы кишечника и вызывает усиление перистальтики; оказывает преимущественное влияние на толстую кишку, вызывая более быстрое опорожнение.

Слабительный эффект наступает через 8-10 ч после приема. Медленное действие и преимущественное влияние на толстый отдел кишечника объясняется тем, что распад антрагликозидов в кишечнике происходит постепенно и действующие вещества накапливаются в количестве, необходимом для послабляющего эффекта, лишь тогда, когда они достигают толстого отдела кишечника.

Показания к применению:

— хронические запоры.

Относится к болезням:

- Запор

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— кишечная непроходимость;

— ущемленная грыжа;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит;

— кровотечения из ЖКТ;

— метроррагия;

— цистит;

— спастические запоры;

— нарушение водно-электролитного обмена.

С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст (до 6 лет), печеночная и/или почечная недостаточность; состояние после полостных операций.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, по 100 мл на ночь, в виде настоя (1 ст.ложку заваривают в 200 мл кипятка, настаивают 2 ч и процеживают).

Побочное действие:

Абдоминальная боль спастического характера, метеоризм, тошнота, рвота, обесцвечивание мочи, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: беременность, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нарушает абсорбцию тетрациклина.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

С осторожностью: почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

С осторожностью: печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

С осторожностью: детский возраст до 6 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zhostera_Slabitelnogo_Plody