

## Зинерит



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления раствора для наружного применения;** приложенный растворитель - бесцветный, прозрачный.

	<b>1 фл.</b>	<b>1 мл готового р-ра</b>
эритромицин	1.2 г	40 мг
цинка ацетата дигидрат микронизированный	360 мг	12 мг

*Растворитель:* диизопропилсебакат, этанол.

Флаконы пластиковые (1) в комплекте с растворителем (фл. 30 мл 1 шт.) и аппликатором - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Эритромицин-цинковый комплекс. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и комедонолитическое действие.

Эритромицин действует бактериостатически на микроорганизмы, вызывающие угревую сыпь: *Propionibacterium acnes* и *Streptococcus epidermidis*. Цинк уменьшает выработку секрета сальных желез, оказывает вяжущее действие.

#### Фармакокинетика

Комплексная связь компонентов препарата обеспечивает хорошее проникновение в кожу активных веществ.

Цинк в основном связывается с фолликулярным эпителием и не резорбируется в системный кровоток.

Незначительная часть эритромицина подвергается системному распределению и в дальнейшем выводится из организма.

### Показания к применению:

— лечение угревой сыпи.

### Противопоказания:

## **Зинерит**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- повышенная чувствительность к эритромицину и другим макролидам;
- повышенная чувствительность к цинку или другим компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат применяют наружно. С помощью прилагаемого аппликатора приготовленный раствор Зинерита наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 2 раза/сут: утром (до нанесения макияжа) и вечером (после умывания). Наносить препарат следует путем наклона флакона с приготовленным раствором вниз, с легким нажимом. Скорость нанесения раствора регулируется силой нажима аппликатора на кожу. Примерная разовая доза - 0.5 мл. После высыхания раствор становится невидимым.

Продолжительность курса - до 10-12 недель. В отдельных случаях клиническое улучшение наступает уже через 2 недели.

### **Побочное действие:**

*Местные реакции:* иногда может возникать ощущение жжения, раздражение, сухость кожи в месте нанесения препарата. Как правило, эти явления слабо выражены и не требуют отмены препарата и/или проведения симптоматической терапии.

### **Передозировка:**

Случайная передозировка маловероятна из-за особенностей местного применения препарата.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

В настоящее время установлено, что применение препарата при беременности и в период лактации возможно по показаниям в рекомендуемых дозах.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

До настоящего времени не установлено клинически значимого взаимодействия Зинерита с другими лекарственными препаратами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При применении препарата следует учитывать возможность перекрестной резистентности к другим антибиотикам группы макролидов, линкомицину, клиндамицину.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза или на слизистую оболочку полости рта и носа, т.к. это может вызвать раздражение и ожог.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Zinerit>