# Зипантола



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с надписью "PA 783" зеленого цвета на одной стороне.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| пантопразол (в форме пантопразола натрия сесквигидрата) | 20 мг |

*Вспомогательные вещества:* маннитол, кросповидон, гипролоза, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат.

*Состав пленочной оболочки:* опадрай AMB желтый 80W32009 (частично гидролизированный поливиниловый спирт, титана диоксид, тальк, железа оксид желтый (E172), лак на основе хинолинового желтого (E104) и алюминия, лецитин (соя), камедь ксантановая).
*Состав кишечнорастворимой оболочки:* эудражит L30D-55 (сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1), натрия лаурилсульфат, полисорбат 80, вода), глицерил моностеарат, триэтилцитрат, полисорбат 80; 5312 пищевой краситель для надписи (бриллиантовый голубой FCF, этанол).

14 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с надписью "PA 784" зеленого цвета на одной стороне.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| пантопразол (в форме пантопразола натрия сесквигидрата) | 40 мг |

*Вспомогательные вещества:* маннитол, кросповидон, гипролоза, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат.

*Состав пленочной оболочки:* опадрай AMB желтый 80W32009 (частично гидролизированный поливиниловый спирт, титана диоксид, тальк, железа оксид желтый (E172), лак на основе хинолинового желтого (E104) и алюминия, лецитин (соя), камедь ксантановая).
*Состав кишечнорастворимой оболочки:* эудражит L30D-55 (сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1), натрия лаурилсульфат, полисорбат 80, вода), глицерил моностеарат, триэтилцитрат, полисорбат 80; 5312 пищевой краситель для надписи (бриллиантовый голубой FCF, этанол).

14 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Ингибитор протонового насоса ($H^+$-$K^+$-АТФ-азы). Блокирует заключительную стадию секреции соляной кислоты,

снижая базальную и стимулированную секрецию, независимо от природы раздражителя. Селективность терапевтического действия пантопразола проявляется в том, что он действует в кислой среде при pH < 3, при больших значениях pH пантопразол практически неактивен.

При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori, нормализация секреции в желудке повышает чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. Не влияет на моторику ЖКТ. Секреторная активность нормализуется через 3-4 дня после окончания приема препарата.

***Фармакокинетика***

*Всасывание*

Быстро абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность составляет около 77%. Прием пищи не влияет на биодоступность. $C_{max}$ в плазме составляет 2-3 мкг/мл, достигается через 2.5 ч и не меняется при многократном приеме.

*Распределение и метаболизм*

$V_d$ составляет около 0.15 л/кг. Метаболизм пантопразола происходит в основном в печени.

*Выведение*

Выводится преимущественно почками (около 80%) в виде метаболитов. $T_{1/2}$ - около 1 ч.

## Показания к применению:

— гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— синдром Золлингера-Эллисона и другие патологические состояния, связанные с повышенной секрецией;

— стрессовые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

— эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВП;

— эрадикация Helicobacter pylori в сочетании с двумя антибиотиками при язвенной болезни желудка и двенадцаперстной кишки, гастритах.

## Относится к болезням:

- Гастрит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

## Противопоказания:

— диспепсия невротического генеза;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Следует с *осторожностью* применять препарат при беременности, в период лактации, при печеночной недостаточности.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, запивая жидкостью и проглатывая целиком (таблетки нельзя размельчать или растворять).

Препарат рекомендуется принимать до завтрака или во время него. При применении препарата 2 раза/сут вторую дозу рекомендуется принимать до ужина.

При *гастроэзофагеальной рефлюксной болезни* назначают по 20-80 мг/сут (в зависимости от степени выраженности патологического процесса). Курс лечения - 4-8 недель.

При *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивном гастрите* - по 40-80 мг/сут. Курс лечения при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки - 2 недели, при обострении язвенной болезни желудка -

4-8 недель.

Для *эрадикации Helicobacter pylori* - по 40 мг 2 раза/сут в комбинации с двумя антибактериальными средствами в течение 7-14 дней (в зависимости от применяемой схемы лечения).

При *эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП,* - по 40-80 мг/сут. Курс лечения - 4-8 недель.

Для *профилактики эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приема НПВП,* - по 20 мг/сут.

У **пациентов с выраженными нарушениями функции печени** доза препарата не должна превышать 20 мг/сут. В этом случае необходимо контролировать биохимические показатели крови. При увеличении уровня печеночных ферментов следует прекратить применение препарата.

**Пожилым пациентам, а также пациентам с нарушенной функцией почек**, нельзя превышать суточную дозу 40 мг. Исключением является применение комбинированной антибактериальной терапии в отношении Helicobacter pylori, когда и пожилые пациенты должны принимать пантопразол в дозе 40 мг 2 раза/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны ЦНС:* головная боль, головокружение.

*Со стороны пищеварительной системы:* диарея, тошнота, боли в верхней части живота, запор, метеоризм.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд и гиперемии кожи, анафилактические реакции, включая анафилактический шок.

*Прочие:* болезненное напряжение молочных желез, гипертермия; очень редко - проходящие после отмены препарата депрессия, миалгия, слабость, головокружение, нарушение остроты зрения.

Во время применения пантопразола крайне редко может появиться тяжелое гепатоцеллюлярное повреждение с желтухой или нарушение функции печени, тяжелые поражения кожи, фотосенсибилизация.

## Передозировка:

До настоящего времени явлений передозировки препарата Зипантола отмечено не было.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Следует с осторожностью применять препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременное применение пантопразола может уменьшить всасывание препаратов, биодоступность которых зависит от pH среды желудка (например, кетоконазол).

## Особые указания и меры предосторожности:

До и после лечения следует обязательно проводить эндоскопический контроль для исключения возможности наличия злокачественных заболеваний желудка или пищевода, т.к. лечение пантопразолом может маскировать симптоматику и отсрочить правильную диагностику.

*Использование в педиатрии*

Препарат не следует назначать детям, т.к. данных о его клиническом применении в педиатрической практике нет.

***При нарушениях функции почек***

**Пациентам с нарушенной функцией почек**, нельзя превышать суточную дозу 40 мг.

***При нарушениях функции печени***

У **пациентов с выраженными нарушениями функции печени** доза препарата не должна превышать 20 мг/сут. В этом случае необходимо контролировать биохимические показатели крови. При увеличении уровня печеночных ферментов следует прекратить применение препарата.

***Применение в пожилом возрасте***

**Пожилым пациентам** нельзя превышать суточную дозу 40 мг. Исключением является применение комбинированной антибактериальной терапии в отношении Helicobacter pylori, когда и пожилые пациенты должны принимать пантопразол в дозе 40 мг 2 раза/сут.

***Применение в детском возрасте***

Препарат не следует назначать детям, т.к. данных о его клиническом применении в педиатрической практике нет.

## Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Zipantola