

[Зовиракс \(мазь\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь глазная 3% мягкая, однородная, белая или почти белая, полупрозрачная, маслянистая, со слабым характерным запахом, не содержащая крупинок, комков и посторонних частиц.

	1 г
ацикловир (микронизированный)	30 мг

Вспомогательные вещества: вазелин белый.

4.5 г - тубы с полиэтиленовой насадкой (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусный препарат для местного применения в офтальмологии. Высокоактивен в отношении вирусов Herpes simplex типа 1 и 2 и Varicella zoster.

После поступления в инфицированные вирусом клетки ацикловир фосфорилируется до активного ацикловира трифосфата под действием вирусной тимидинкиназы. Ацикловир трифосфат действует как неспецифический ингибитор и субстрат для вирусной ДНК-полимеразы и предотвращает синтез вирусной ДНК без повреждения клеток хозяина.

Фармакокинетика

После инстилляции глазной мази ацикловир быстро абсорбируется эпителием роговицы и окологлазными тканями, в результате чего во внутриглазной жидкости создается концентрация препарата, необходимая для подавления вируса. Ацикловир определяется в моче в незначительной концентрации, не имеющей терапевтического значения.

Показания к применению:

— кератит, вызванный вирусом Herpes simplex типа 1 и 2.

Относится к болезням:

- [Кератит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к ацикловиру или валацикловиру.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям препарат в виде полоски мази длиной 10 мм следует поместить в нижний конъюнктивальный мешок. Кратность применения 5 раз/сут с интервалом около 4 ч. Терапию следует продолжать еще в течение 3 дней после заживления.

Побочное действие:

Побочные эффекты приведены в соответствии с частотой встречаемости в ходе клинических исследований: очень часто - >10%; часто - от >1% до <10%; иногда - от >0.1% до <1%; редко - от >0.01% до <0.1%; очень редко - <0.01%.

Аллергические реакции: очень редко - реакции гиперчувствительности немедленного типа (в т.ч. ангионевротический отек).

Со стороны органа зрения: иногда - точечная поверхностная кератопатия (не требует прекращения лечения и исчезает без последствий); часто - легкое жжение (преходящее со временем); иногда - конъюнктивит; редко - блефарит.

Передозировка:

Передозировка мази глазной Зовиракс маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности возможно в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

При поступлении в системный кровоток матери ацикловир проникает в грудное молоко, но количество препарата, которое может получить ребенок при применении мази глазной, крайне незначительно.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие мази глазной Зовиракс не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно появление легкого жжения после применения мази глазной Зовиракс, проходящего самопроизвольно.

Во время терапии препаратом не следует носить контактные линзы.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Мазь глазную следует использовать в течение 1 месяца после вскрытия упаковки.

Срок годности:

5 лет.

Зовиракс (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zoviraks_maz