

## Зверобоя Трава



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

↙ <b>Сырье растительное - порошок</b>	<b>1 фильтр-пакет</b>
трава зверобоя продырявленного	1.5 г

фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.  
фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Настой травы зверобоя обладает вяжущим, противовоспалительным действием.

### Показания к применению:

Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (в т.ч. гингивит, стоматит); хронический колит (в составе комплексной терапии).

### Относится к болезням:

- [Колит](#)
- [Стоматит](#)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 12 лет. При приеме внутрь - беременность, период лактации.

### Способ применения и дозы:

2 фильтр-пакета (3 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, накрывают крышкой и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

## **Зверобоя Трава**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения - 2-3 недели.

Для полосканий применяют по 1/2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день. Курс лечения - 5-10 дней. Перед применением настоев рекомендуется взбалтывать.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. При приеме внутрь - фотосенсибилизирующее действие (повышенная чувствительность кожи к действию солнечного света). При длительном применении может вызвать неприятные ощущения в области печени (в правом подреберье) и чувство горечи во рту.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Настой травы зверобоя нельзя принимать внутрь при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При совместном применении настоя зверобоя с циклоспорином, варфарином, дигоксином, стероидными препаратами, противовирусными средствами - ингибиторами протеазы ВИЧ (ампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир) возможно снижение их активности. Препарат способен усиливать фотосенсибилизирующее действие других лекарственных средств, в т.ч. тетрациклинов, сульфаниламидов, тиазидных диуретиков, хинолонов, пироксикама.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время лечения следует воздержаться от длительного пребывания на солнце, от посещения солярия.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 12 лет.

### **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Zveroboya\\_Trava](http://drugs.thead.ru/Zveroboya_Trava)