

## Эликсин



### Код АТХ:

- [D02AE](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Раствор для наружного применения (спиртовой)** желтого цвета, прозрачный, со слабым ароматным запахом.

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | <b>100 мл</b> |
| салициловая кислота     | 2 г           |
| настойка календулы      | 10 мл         |
| экстракт эхинацеи сухой | 0.3 г         |

*Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль - 10 мл, вода очищенная - 20 мл, этанол 95% (спирт этиловый) - до 100 мл.

250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

500 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (8) - пачки картонные.

1000 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (8) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат. Обладает выраженными противовоспалительными свойствами и антимикробной активностью в отношении *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*. Наличие в составе препарата пропиленгликоля обуславливает защиту кожи от чрезмерного подсушивания этанолом.

### Показания к применению:

— профилактика развития пролежней у лежачих больных (в т.ч. после операций, травм, ожогов и обморожений).

## Относится к болезням:

- [Обморок](#)
- [Пролежни](#)
- [Травмы](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата.

## Способ применения и дозы:

Наружно, обрабатывать проблемные места (без нарушения целостности кожного покрова) 2-3 раза в день с помощью ватно-марлевого тампона, пропитанного препаратом. Курс профилактики - 14 дней. При необходимости курсы можно повторять с интервалами 2-4 недели.

## Побочное действие:

Аллергические реакции. Лечение симптоматическое.

## Передозировка:

При применении препарата в соответствии с рекомендациями случаев передозировки не зарегистрировано.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача!

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата Эликсин не исключает терапию другими лекарственными средствами.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для наружного применения!

## Условия хранения:

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/eliksin>

