Эликсин



Код АТХ:

- D02AF

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения (спиртовой)*** желтого цвета, прозрачный, со слабым ароматным запахом.

	100 мл
салициловая кислота	2 г
настойка календулы	10 мл
экстракт эхинацеи сухой	0.3 г

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 10 мл, вода очищенная - 20 мл, этанол 95% (спирт этиловый) - до 100 мл.

250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
500 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (8) - пачки картонные.
1000 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (8) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Обладает выраженными противовоспалительными свойствами и антимикробной активностью в отношении Staphylococcus aureus, Bacillus sublilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Наличие в составе препарата пропиленгликоля обусловливает защиту кожи от чрезмерного подсушивания этанолом.

Показания к применению:

— профилактика развития пролежней у лежачих больных (в т.ч. после операций, травм, ожогов и обморожений).

Относится к болезням:

- Обморок
- Пролежни
- Травмы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно, обрабатывать проблемные места (без нарушения целостности кожного покрова) 2-3 раза в день с помощью ватно-марлевого тампона, пропитанного препаратом. Курс профилактики - 14 дней. При необходимости курсы можно повторять с интервалами 2-4 недели.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Лечение симптоматическое.

Передозировка:

При применении препарата в соответствии с рекомендациями случаев передозировки не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата Эликсин не исключает терапию другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для наружного применения!

Условия хранения:

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/eliksin