Эмоксибел (капли)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Метилэтилпиридинол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные 1% прозрачные, бесцветные или с желтым оттенком.

	1 мл
метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)	10 мг

Вспомогательные вещества: натрия сульфат, натрия бензоат, калия фосфат однозамещенный, натрия фосфат двузамещенный 12-водный, вода д/и.

5 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антиоксидант (лекарственное средство, препятствующее перекисному окислению липидов клеточных мембран), обладающий ангиопротекторной (повышающей устойчивость сосудов), антиагрегационной (препятствующей склеиванию тромбоцитов) и антигипоксической (повышающей устойчивость ткани к нехватке кислорода) активностью.

Уменьшает проницаемость капилляров и укрепляет сосудистую стенку (ангиопротектор). Уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов (антиагрегант). Ингибитор свободнорадикальных процессов, обладает мембраностабилизирующим действием.

Обладает ретинопротекторными свойствами, защищает сетчатку и другие ткани глаза от повреждающего действия света высокой интенсивности. Способствует рассасыванию Внутриглазных кровоизлияний, снижает свертываемость крови, улучшает микроциркуляцию глаза. Стимулирует репаративные процессы в роговице (в том числе в раннем послеоперационном и постраневом периоде).

Фармакокинетика

Быстро проникает в органы и ткани, где происходит его депонирование и метаболизм. В тканях глаза концентрация выше, чем в крови. Обнаружено 5 метаболитов, представленных дезалкилированными и конъюгированными продуктами метаболизма. Метаболизируется в печени. В значительных количествах в печени обнаруживается активный метаболит 2-этил-6-метил-3-оксипиридинфосфат. Далее в крови под влиянием щелочной фосфатазы происходит расщепление 2-этил-6-метил-3-оксипиридинафосфата на фосфорную кислоту и 3-оксипиридин. Метаболиты экскретируются почками.

Показания к применению:

Применяется у взрослых при следующих заболеваниях и состояниях:

— кровоизлияния в переднюю камеру глаза (лечение);

— кровоизлияния в склеру у лиц пожилого возраста (лечение и профилактика);

— воспаления и ожоги роговицы (лечение и профилактика);

— осложнения при близорукости (лечение);

— защита роговицы (при ношении контактных линз).

Относится к болезням:

- Воспаление
- Кровоизлияния в переднюю камеру глаза
- Склерит

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— беременность, период лактации;

— детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3-30 дней) и определяется врачом. При наличии показаний и хорошей переносимости продолжительность курса лечения может составлять до 6 месяцев. Повторные курсы лечения могут проводиться 2-3 раза в год.

Побочное действие:

Ощущение жжения, зуд в глазу, кратковременная гиперемия конъюнктивы, местные аллергические реакции.

Передозировка:

Не описана.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание необходимо прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При необходимости одновременного применения других глазных капель препарат закапывают последним не ранее, чем через 15 минут (после полного всасывания предыдущего лекарственного средства). Влияние на управление транспортными средствами или работу со сложной техникой не описано.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/emoksibel_kapli